БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
ГЕОЛЁГІЧНЫ ІНСТЫТУТ

Проф. М. Т. БЛІОДУХО

РЕГІСТРАЦЫЙНЫ СЬПІС
КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ БССР

З КАРОТКІМ НАРЫСАМ,
ТАБЛІЦАМІ І КАРТАЮ

ВЫДАНЬНЕ БЕЛАРУСКАЕ АКАДЭМІІ НАВУК
МЕНСК — 1931

10

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
ГЕОЛЁГІЧНЫ ІНСТЫТУТ

Проф. М. Т. БЛІОДУХО

55
289
ПРОВЕРЕНО

РЕГІСТРАЦЫЙНЫ СЬПІС КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ БССР

З КАРОТКІМ НАРЫСАМ,
ТАБЛІЦАМІ І КАРТАЮ

инв 5672

Библиотека
Геологического Н.-Д. Института
Института

МЕНСК — 1931

Бібліотека
13492

Менск. Друк. БАН. Галоўлітбел № 244. 9 арк. Зак. № 638. Тыр. 5

ЦНБ им. Я. КОЛАСА
НАН Беларуси

55
289

УСТУП

Вывучэньне мінэральнай сыравіны Белар[illegible] клікае ў пер-
ую чаргу неабходнасьць рэгістрацыі [illegible]ных выкап-
яў, якія пры сучасным стане тэхнікі [illegible]ь ужываццa
посьпехам у прамысловасьці і сельскай гас[illegible]дарцы.

Прымаючы пад увагу тую асаблівасьць, што карыснымі
ыкапнямі ў цэлым шэрагу выпадкаў зьяўляюцца ня толькі
аасобныя мінэралі, але і горныя пароды, з якіх пабудавана
она адкладаў земнай кары, даступная нашаму дасьледвань-
ю, — пытаньне аб належным іх вывучэньні і рэгістрацыі
жа быць разьвязана толькі тады, калі будзе зроблены
адрабязная літалёгічная здымка ўсёй плошчы БССР і будуць
хладзены адпаведныя буйнага маштабу літалёгічныя карты
тай тэрыторыі.

У сучасны момант матар'яламі для вызначэньньня ка-
ысных выкапняў Рэспублікі зьяўляюцца даныя некаторых
таратурных крыніц, а галоўнае—вынікі папярэдняй апра-
оўкі палявых матар'ялаў маршрутных геолёгічных партый,
рацаваўшых на тэрыторыі БССР у апошнія гады.

Складзены мною сьпіс карысных выкапняў БССР зьяў-
нецца трэцім і мае 527 нумароў паасобных згуртаваньняў
абгаленьняў розных парод і мінэраляў.

Першы сьпіс быў складзены мною па Горнаму Аддзелу
СНГБ у 1926 годзе і меў толькі 176 нумароў. Да яго была
блена адпаведная карта карысных выкапняў БССР. Ма-
ялямі да складаньня гэтага сьпісу зьявіліся даныя літа-
урных крыніц і вынікі маршрутных досьледаў геолёгіч-
х партый, з'організаваных Дзяржплянам БССР.

1928 годзе гэты сьпіс і карта былі перароблены мною
падставе новых матар'ялаў, набытых маршрутнымі да-
ледваньнямі тэрыторыі БССР геолёгічнымі партыямі, пра-
аўшымі ад Камісіі па вывучэньню прыродных вытворчых
Беларусі і мелі ўжо 292 нумары.

Організацыя Геолёгічнага Інстытуту пры Беларускай Ака-
Навук і значнае разгортваньне геолёгічнай работы на

тэрыторыі Рэспублікі далі магчымасьць за апошні час амаль што падвоіць колькасьць зарэгістраваных карысных выкапняў.

Трэба адзначыць, што зробленыя да сучаснага моманту маршрутныя досьледы мелі на ўвазе як мага хутчэй ахапіць усю тэрыторыю БССР і высьветліць геолёгічную будову адкладаў паверхневай зоны ў агульных рысах, і дасьледчыкі ня мелі магчымасьці праводзіць дэталёвае вывучэньне генэзісу паасобных згуртаваньняў карысных выкапняў, што застаецца яшчэ проблемаю бліжэйшай будучыні.

Складзены мною сьпіс з прычыны вышэйадзначанага зьяўляецца рэгістрацыйным сьпісам карысных выкапняў Рэспублікі і ўключае даныя, набытыя непасрэдна мною пры геолёгічных дасьледваньнях Беларусі, даныя, набытыя супрацоўнікамі Геолёгічнага Інстытуту БАН, а таксама ўзятыя з некаторых літаратурных крыніц.

Маршрутнае дасьледваньне геолёгічнай будовы тэрыторыі БССР яшчэ ня скончана, і некаторыя раёны, як гэта можна заўважыць па даных сьпісу, гэтымі маршрутамі зусім не закрануты, а другія дасьледваны толькі часткова.

Паколькі маршрутныя геолёгічныя досьледы мелі сваёй мэтаю ў першую чаргу вызначыць тыя раёны, якія багаты на тыя ці іншыя карысныя выкапні і маглі-б стацца ў бліжэйшыя гады асяродкамі буйных горных распрацовак нетраў Рэспублікі, то гэтыя маршрутныя досьледы неаднолькава разьмежаваліся па ўсёй плошчы БССР. Згодна з гэтым, складзены мною сьпіс не дае канчатковага малюнку, які характарызаваў-бы знаходжаньне розных карысных выкапняў на тых ці іншых плошчах, а толькі паказвае знаходжаньне іх на зробленых маршрутах.

Згладжаны рэльеф мясцовасьці, адсутнасьць на значных плошчах прыродных абгаленьняў, за выключэньнем далін паасобных рэчак, нязначнае разьвіцьцё распрацовак нетраў— не давалі неабходных даных для вывучэньня генэзісу згуртаваньняў карысных выкапняў, зарэгістраваных пры маршрутных геолёгічных досьледах, чаму і ацэнка прамысловага значэньня цэлага раду абгаленьняў мае выключна папярэдні характар і патрабуе для належнага заключэньня аб іх прамысловай каштоўнасьці дадатковага правядзеньня горных работ.

Навуковая ацэнка паасобных згуртаваньняў альбо абгаленьняў карысных выкапняў і ўключэньне іх у рэгістрацыйны сьпіс мае пэрсональны характар. У тых выпадках, калі матар'ялы былі сабраны непасрэдна мною пры палявых геолё-

гічных досьледах тэрыторыі БССР, я карыстаўся данымі выключна гэтага вывучэньня.

У тых выпадках, калі мною ня было зроблена агляду згуртаваньня на месцы, у рэгістрацыйным сьпісе зазначана праца таго дасьледчыка, па даных якога гэтае згуртаваньне ўключана ў сьпіс.

Паасобныя манографіі, асабліва больш даўныя, у цэлым шэрагу выпадкаў пры вызначэньні нярудных выкапняў даюць недастаткова выразныя даныя аб месцы іх знаходжаньня, а яшчэ менш прыводзяць даных да характарыстыкі саміх выкапняў. З гэтай прычыны ў сьпіс ня ўносіліся ўсе даныя розных манографій, а толькі некаторыя. У тым выпадку, калі можна было знайсьці падставы для адзначэньня эканомічнай каштоўнасьці згуртаваньня хаця-б для распрацовак мясцовага характару, згуртаваньне ўключалася ў рэгістрацыйны сьпіс.

Магчыма, што некаторыя з адзначаных у сьпісе згуртаваньняў, у выніку недастатковай іх характарыстыкі альбо дзякуючы інтэнсыўнай распрацоўцы іх у ранейшыя гады пры нязначным запасе, будуць мець толькі навуковае, а не прамысловае значэньне.

Прымаючы пад увагу, што вывучэньне органічных адкладаў, асабліва торфу, зьяўляецца задачаю НКЗБ, гэтыя адклады маршрутнымі геолёгічнымі партыямі не вывучаліся, і ў рэгістрацыйны сьпіс уключаны толькі адклады даўных торфа-вугаляў і сапрапэляў, знойдзеных пры вывучэньні іншых карысных выкапняў.

Камэральнае і лябораторнае вывучэньне карысных выкапняў БССР у большасьці яшчэ ня зроблена, і мы ня маем даных, каб вызначыць прамысловую номэнклятуру альбо навуковую групу, у якую трэба залічыць карысныя выкапні з вывучаных абгаленьняў.

Пакуль што пакінута тая назва выкапню, якая была дана яму дасьледчыкам.

Можа здарыцца, што пасьля дэталёвага вывучэньня прыдзецца зьмяніць самую назву некаторых выкапняў. Так, замест гліністай крэйды прыдзецца пароду лічыць маргелем; замест гліны—суглінкам і г. д.

Вывучэньне паасобных згуртаваньняў карысных выкапняў альбо абгаленьняў парод сьведчыць аб тым, што ў адным і тым-жа абгаленьні мы маем розныя адклады і падрабязна ахарактарызаваць іх у сьпісе зьяўляецца немагчымым, дзякуючы чаму агульная назва, як крэйда, маргель і т. д., зьяўляюцца характэрнымі толькі для галоўных адкладаў.

Паколькі ў сьпісе галоўным чынам пералічаны так званыя нярудныя выкапні, якія звычайна займаюць у паверхневай зоне значныя плошчы і ў цэлым шэрагу выпадкаў сустракаюцца паміж некалькімі вёскамі, то вызначэньне згуртаваньня ля аднэй вёскі мае ўмоўны характар. Вызначаецца тое месца, дзе ўмовы знаходжаньня карыснага выкапню зьяўляюцца найбольш спрыяючымі.

У некаторых выпадках адзін адклад вылучаецца на некаторай адлегласьці ў паасобнае згуртаваньне, бо адклады чацьвярцёвага пэрыоду наогул не захоўваюць сваіх асаблівасьцяй і хутка зьмяняюцца, не дапускаючы ўключэньня ўсяго адкладу ў адзіную масу.

Рэгістрацыйны сьпіс карысных выкапняў БССР складзены мною на падставе ўсіх тых даных, якія магчыма было набыць да гэтага часу, але паколькі ён грунтуецца на матар'ялах маршрутных геолёгічных досьледаў, а ў некаторых выпадках на даных літаратурных крыніц, то ён, бязумоўна, мае значныя недахопы і патрабуе далейшай апрацоўкі.

Шчырая просьба да ўсіх таварышоў, якія заняты вывучэньнем і распрацоўкай мінэральная сыравіны Рэспублікі, прыслаць у Геолёгічны Інстытут Беларускай Акадэміі Навук свае заўвагі і дадаткі, якія з удзячнасьцю будуць прыняты і скарыстаны ў бліжэйшы час.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ, УКЛЮЧАНЫХ У РЭГІСТРАЦЫЙНЫ СЬПІС

Ня гледзячы на тое, што да апошняга часу папярэдняе геолёгічнае вывучэньне тэрыторыі БССР маршрутнымі геолёгічнымі партыямі яшчэ ня скончана і ў рэгістрацыйны сьпіс уключаны карысныя выкапні толькі па 76 раёнах, а па астатніх 24 даныя ня ўключаны, — усё-ж такі трэба адзначыць, што агульны характар геолёгічных адкладаў, з якіх пабудавана тэрыторыя БССР на даступную нашаму вывучэньню глыбіню, і тыпы тых карысных выкапняў, якія знаходзяцца ў гэтых адкладах, нам ужо вядомы ў дастатковай ступені.

Трэба сказаць, што і ў тых раёнах, якія ня былі дасьледваны партыямі Геолёгічнага Інстытуту БАН і аб якіх няма даных у складзеным мною рэгістрацыйным сьпісе, праводзіліся часткова досьледы партыямі ГГРУ СССР і ВСНГБ і вызначаліся імі знойдзеныя карысныя выкапні. Таксама трэба адзначыць і клясычную працу па геоморфолёгічнаму апісаньню нашага Палесься, зробленую акадэмікам П. А. Туткоўскім у трохвярстовым маштабе. Гэта апісаньне дае хоць некаторы матар'ял аб тых плошчах, якія не дасьледваны яшчэ геолёгічнымі партыямі Інстытуту Беларускае Акадэміі Навук.

Прымаючы пад увагу, што гэтымі досьледамі ня выкрыта іншых тыпаў карысных выкапняў, у агульных рысах ужо можна рабіць агляд мінэральных багацьцяў нетраў Рэспублікі.

Назву карысных выкапняў мы даем тым мінэралям і горным пародам, якія ўжываюцца як мінэральная сыравіна ў прамысловасьці і ў сельскай гаспадарцы.

Да апошніх гадоў карыснымі выкапнямі лічыліся галоўным чынам мінэралі, з якіх здабываліся мэталі, і ўсе пытаньні, зьвязаныя з распрацоўкаю нетраў зямлі, мелі на ўвазе гэтыя так званыя „рудныя выкапні".

Наадварот, мінэралі, якія зьяўляліся галоўнымі часткамі тых мас, з якіх пабудавана земная кара, адносіліся спэцыялістамі да „нярудных выкапняў“; да апошняга часу яны ня лічыліся асабліва карыснымі і нават не рэгістраваліся.

Кастрычнікавая рэволюцыя зрабіла такія глыбокія зрухі ў сучаснай тэхніцы і настолькі актывізавала запатрабаваньні да мінэральнай сыравіны, што пры соцыялістычнай перабудове нашай прамысловасьці і сельскай гаспадаркі гэтыя, здавалася, малакаштоўныя „нярудныя выкапні“ зьявіліся об‘ектамі самага шырокага ўжываньня, і запатрабаваньне на іх склала новую проблему ў горнай справе.

Сучасная тэхніка Саюзу, укараненьне хэміі ў процэсы вывучэньня і скарыстаньня мінэральнай сыравіны ў значнай ступені павялічылі лік так званых „карысных выкапняў“ і далі новыя напрамкі для іх скарыстаньня.

Усякі мінэраль альбо парода будуць скарыстаны належным парадкам толькі тады, калі яны знаходзяцца ў патрэбнай колькасьці ў даным месцы, маюць добрыя эканомічныя ўмовы для свайго скарыстаньня і асабліва па сваёй якасьці адпавядаюць запатрабаваньням тэхнікі, што для „нярудных выкапняў“ мае асабліва важнае значэньне.

Усе паказаныя карысныя выкапні Рэспублікі можна падзяліць на наступныя групы:

А. Нярудныя выкапні.

1)	Долёміты і долёмітызаваныя вапнякі пластовыя	23
2)	Вапнякі пластовыя палеозойскага пэрыоду	3
3)	Крэйда пішучая, гліністая і г. д.	86
4)	Маргелі старадаўныя рознага геолёгічнага ўзросту	16
5)	Маргелі лугавыя і азёрныя чацьвярцёвага пэрыоду	26
6)	Травэрцыны	1
7)	Валуны вапняковыя (паасобныя палі, озы, уключэньні ў галечніках і г. д.)	37
8)	Крэмені розных тыпаў	6
9)	Трэпелы, дыятоміты і інфузорныя землі	2
10)	Апокі	3
11)	Валуны крышталёвых парод	26
12)	Галечнікі	16
13)	Граві	7
14)	Пяскі розныя	52
15)	Гліны (керамічныя, будаўнічыя і г. д.)	76
16)	Флёрыдыны	2
17)	Суглінкі розныя	75

18) Лёсы	4
19) Фасфарыты (плітнякі, конкрэцыі розных тыпаў)	18
20) Іскракі (пірыт, марказіт)	2
21) Торфа-вугалі і сапрапэлі	3
22) Гляўконітавыя пароды (вапнякі, пяскі і гліны) .	—
23) Мінэральныя фарбы і вохры	—
24) Крыніцы мінэралізаваныя	5
	489

Б. Рудныя выкапні.

1) Бурыя жалезьнякі (ліманіты) розных тыпаў .	36
2) Чырвоныя жалезьнякі (гэматыты) . . .	2
3) Фосфарна-кіслыя жалезьнякі (вівіяніты) . .	—
	38.

Гэтая табліца паказвае, што галоўная частка карысных выкапняў, вызначаных па тэрыторыі БССР, да сучаснага моманту належыць да групы „нярудных выкапняў"; з выкапняў, якія маюць у сваем складзе які-небудзь мэталь, мы маем толькі руды жалеза, галоўным чынам у стане ліманітаў, зьвязаных па свайму паходжаньню з прысутнасьцю значных органічных мас у вадаёмах стаячай вады.

З нярудных выкапняў асабліва важнае значэньне мае наяўнасьць у адкладах паверхневай зоны розных вяпнякоў, якія ўжываюцца ў прамысловасьці і сельскай гаспадарцы.

Тут мы маем долёміты і долёмітызаваныя вяпнякі сілюрскага і дэвонскага пэрыодаў, якія сустракаюцца ў карэнным стане і пласткі якіх выходзяць на паверхню ў некаторых мясцох вышэй роўню грунтовых вод, пры нязначанай перакрышы іншымі пародамі, альбо залягаюць на нязначнай глыбіні.

Долёмітызаваныя пластовыя вапнякі сілюрскага пэрыоду сустракаюцца ля вёскі Раванічы (абг. № 406) і вёскі Хутар (абг. № 407), дзе яны маюць ад 30,86% да 37,27% Cao і ад 7,41% да 10,91% Mgo. Усе астатнія абгаленьні пластовых долёмітаў і долёмітызаваных вапнякоў, вызначаных на тэрыторыі БССР, належаць да адкладаў дэвонскага пэрыоду. Як у межах адкладаў галоўнага дэвонскага поля на Полаччыне і Віцебшчыне па рацэ Заходняй Дзьвіне вышэй Віцебску (абг. № 47—49 і 337—339) і па рацэ Сар'янцы ля вёскі Калюты (абг. № 305 і 306), так і далей на поўдзень у паасобных абгаленьнях долёмітаў у вадазборы ракі Дняпра і яго прытокаў ля гораду Воршы (абг. № 229—232) і вёскі

Кабелякі (абг. 233); па рацэ Сажу ля гораду Крычава (абг. № 62), ля гораду Прапойску (абг. № 223—225); на Бабруйшчыне ля станцыі Дараганава (абг. № 3-4; 285 і 421-422) і інш.,—мы маем долёміты, якія зьмяшчаюць да 42,96% $MgCo_3$, што пры наяўнасьці $CaCo_3$ да 54,34% амаль што адпавядае складу нормальнага долёміту. Апошні, вядомы пад назваю горкага шпату, зьмяшчае, згодна хэмічнай формулы $CaCo_3+MgCo_3$, 54,35% карбонату кальцыя і 45,65% карбонату магнія. Зьмяшчаючы ў некаторых паасобных выпадках да 97,08% карбонатаў, гэтыя долёміты зьяўляюцца высокаякаснымі і могуць ужывацца пасьля апаленьня як агнятрывалыя матар'ялы, у якасьці флюсаў (плаўняў) пры мэталюргічных процэсах, пры вырабе цэманту па спосабу Сарэля, з іх таксама могуць здабывацца $MgSo_4$—эпсаміт і MgO magnesia usta.

У значна большай ступені пашыраны долёмітызаваныя вапнякі, якія сустракаюцца сьвітамі паасобных пласткоў, маюць розную якасьць, зьяўляючыся ў некаторых выпадках гліністымі альбо скрамянелымі; пракідаюцца паміж імі і слаба бітумінозныя.

Адначасова сярод агульнай масы долёмітаў і долёмітызаваных вапнякоў дэвонскага пэрыоду мы маем і вапнякі, якія зьяўляюцца амаль чыстымі карбонатамі кальцыю. У ваколіцах гораду Крычава ў канцы Ветранай вуліцы з правага боку ад шляху на г. Чавусы (абг. № 61) былі знойдзены мною адклады сьветла-жоўтых з бурымі і чырвонымі плямамі вапнякоў палеозойскага перыоду, якія па даных хэмічнага аналізу зьмяшчаюць да 52,49% CaO і толькі да 0,63% MgO. Гэтыя вапнякі, маючы да 92,50% $CaCo_3$, зьяўляюцца добрымі матар'яламі для здабываньня вапны.

Пластовыя долёміты і вапнякі палеозойскага ўзросту, як можна заўважыць з складзенага сьпісу, не згуртаваны ў адным месцы, а наадварот, выходзяць на паверхню ў значных абгаленьнях і ў розных месцах, што мае эканомічнае значэньне для мясцовага іх скарыстаньня.

Акрамя пластовых выхадаў, гэтыя долёміты і вапнякі сустракаюцца ў стане валуноў і галькі ў чацьвярцёвых адкладах, якія перакрываюць моцным пакровам ранейшыя карэнныя адклады і даюць згуртаваньні, якія маюць прамысловы характар. У складзеным сьпісе вызначана да 30 месц, дзе концэнтрацыя іх заўважана значна павялічанай.

Асабліва важнае значэньне для прамысловасьці і сельскай гаспадаркі БССР маюць адклады крэйды розных тыпаў, якія сустракаюцца ў паверхневых зонах на поўдзень ад галоў-

нага дэвонскага поля. Вызначана, што адклады крэйдавага пэрыоду больш усяго пашыраны ў вадазборы ракі Сажа, дзе яны займаюць значныя плошчы і складаюць унутраныя часткі ўзвышшаў, пракідаюцца ў выглядзе моцных абгаленьняў, даючы тоўшчы да 30 мэтраў вышэй роўню грунтовых вод. У гэтых абгаленьнях адклады крэйды маюць пластовы характар, прычым звычайна розныя пласткі па сваёй якасьці адрозьніваюцца ў значнай ступені, што трэба мець на ўвазе як пры проектаваньні, падлічваючы запасы адкладаў, так і пры распрацоўках. Тут мы маем адклады пухкай пішучай крэйды туронскага пэрыоду, якая мае ў некаторых абгаленьнях ад 94,57% да 96,80% $CaCo_3$ пры нерашчыняемай астачы ад 0,38 да 2,12%. Часта яе падсьцілае пяшчаністая крэйда сэнаманскага ўзросту, якая мае толькі да 65,27% $CaCo_3$ пры нерашчыняемай астачы да 24,67%; глыбей, узбагачаючыся кварцавымі зярнятамі, яна пераходзіць паступова ў карбонатныя кварцавыя пяскі. Сустракаюцца адклады і гліністай крэйды і крэйдавых рухлякоў, якія зьмяшчаюць у рознай колькасьці дамешку тленьнікаў жалеза і гліназёму, розных сілікатаў і алюмасілікатаў у агульнай суме ад 5,0% да 20% масы: так, гліністая крэйда з аднаго пласта ў ваколіцах горада Клімавіч мае да 79,0% $CaCo_3$ пры 14,39% нерашчыняемае астачы.

Адклады крэйды ў вадазборы Сажа знаходзяцца ў першапачатковым заляганьні і перакрываюцца адкладамі трацьцёвага пэрыоду больш на поўдзень, у ніжнім цячэньні ракі, а адкладамі чацьвярцёвага часу па ўсёй астатняй плошчы, але пераважна на поўначы, у верхнім цячэньні ракі Там, дзе гэтая перакрышка зьяўляецца нязначнай па таўшчыні, эканомічна выгадна весьці распрацоўку адкладаў крэйды. Найбольш важнымі абгаленьнямі крэйды ў вадазборы ракі, Сажа трэба лічыць абгаленьні ля вёскі Рэзанцы (абг. № 66) і Куравічы (абг. № 65) па рэчцы Вехры; абгаленьні па рацэ Астры ля вёсак Нанаскавай (абг. № 71) і Іванаўшчыны (абг. № 104), ля г. Клімавіч у вадазборы ракі Лабжанкі на крэйдавай гары і ў другіх месцах; нарэшце цэлы рад значных абгаленьняў па самай рацэ Сажу, як напрыклад, абгаленьні крэйды ля вёсак Парадзіна (абг. № 69), Задабрасьць, Паклады, м. Гайшын і г. д.

Адклады пішучай крэйды, гліністай крэйды і крэйдавых рухлякоў знойдзены ў вадазборы рэк Дняпра і Нёмна на Меншчыне і Бабруйшчыне, але да апошняга часу застаюцца яшчэ слаба вывучанымі. Мы ня ведаем у цэлым шэрагу абгаленьняў, ці крэйда ў іх знаходзіцца ў карэнным стане, ці

яна зьяўляецца толькі ўключэньнем значнымі паасобнымі кавалкамі ў ледавіковых адкладах; ня вызначаны таксама і геолёгічны ўзрост розных адкладаў крэйдавага пэрыоду. Паколькі дасьледваньне гэтай крэйды праводзіцца мною ў сучасны момант, трэба спадзявацца, што неабходныя даныя будуць здабыты ў бліжэйшы тэрмін.

Высокая тэхнічная якасьць некаторых адкладаў крэйды, значная іх колькасьць, спрыяючыя ўмовы знаходжаньня — усе гэтыя абставіны робяць адклады крэйды найбольш важнымі ў нашай мінэральнай сыравіне. У складзеным мною сьпісе вызначана 81 абгаленьне крэйды—прыблізна ў 3 разы больш, чым абгаленьняў вапнякоў палеозойскага ўзросту, а па эканомічнай масе адклады крэйды настолькі пераважаюць апошнія, што ня можа быць ніякага параўнаньня.

У раёнах значнага пашырэньня крэйдавых адкладаў трэба адзначыць наяўнасьць другарадных адкладаў вапнякоў з крыніц, якія маюць у растворы $Ca(HCO_3)_2$—так званых вапняковых туфаў і травэрцынаў. У часе палявых геолёгічных досьледаў мною было знойдзена ў вадазборы рэчкі Асьленкі, паміж вёскамі Асьленкай і Белішчынай (абг. № 516) у адкладах чацьвярцёвага пэрыоду досыць моцнае абгаленьне травэрцынаў, якія перакрываюць тут адклады ніжэйзьмешчанай тоўшы крэйды. Па даных хэмічных аналізаў гэтыя травэрцыны зьяўляюцца высокаякаснымі вапнякамі, якія маюць ад 95,91% да 97,07% $CaCo_3$ і толькі ад 0,13% да 0,26% нерашчыняемай астачы. Зьяўляючыся па сваёй прыродзе хэмічнымі ападкамі, яны ня маюць у сваім складзе зернят пяску і гляўконіту.

Сярод розных адкладаў, пашыраных на тэрыторыі БССР, асабліва важнымі зьяўляюцца розныя маргелі і моцна карбонатныя пароды. Паміж адкладаў гэтай групы можна вызначыць па характару паходжаньня і па ўмовах, у якіх яны знаходзяцца, дзьве паасобныя падгрупы.

Да першай падгрупы належаць усе маргелі і маргелістыя пароды морскага тыпу, якія ўваходзяць у сэрыі карэнных адкладаў дэвонскага, крэйдавага і трацьцёвага пэрыодаў і зьвязаны з імі зональна. Гэтыя маргелі даюць значныя па масе адклады пластовага тыпу і захоўваюць добра свае ўласьцівасьці. Паміж імі да апошняга часу ня вызначана маргеляў, якія маюць тэорытычны склад цэмантавых маргеляў, але пры а начасовым знаходжаньні ў сэрыі адкладаў як вапнякоў, так і глін, атрыманьне масы належнага складу для вырабу партлянд-цэманту ня можа лічыцца асабліва цяжк м.

Да другой падгрупы належаць маргелі, якія стварыліся галоўным чынам у працягу чацьвярцёвага пэрыоду і належаць па свайму паходжаньню да акладаў контынэнтальнага тыпу. У большасьці гэта так званыя прэснаводныя рэчныя, азёрныя і лугавыя маргелі. Воды, багатыя бікарбонатамі кальцыю, у прысутнасьці значных мас гніючых расьлін даюць ападкі карбонату кальцыя, які, гуртуючыся на дне вадаёмаў стаячай вады ў залівах азёр і затоках рэчак, дае адклады маргеляў у сярэднім да 0,5 мэтра таўшчыні. Сустракаючыся ў стане паасобных лінзаў, гэтыя адклады маргеляў, ня гледзячы на значнае пашырэньне ў некаторых раёнах, даюць абмежаваны запас эксплёатацыйнай масы і маюць толькі мясцовае значэньне. Розныя маргелі значна адрозьніваюцца паміж сабою ня толькі па хэмічнаму складу, галоўным чынам, па ўтрыманьню карбонату кальцыя, але і па розных іншых уласьцівасьцях. Маргелі пападаюцца рознага колеру, рознага складу і структуры. Паміж рознымі групамі маргеляў асабліва важнае значэньне маюць так званыя керамічныя маргелі. Сюда належаць маргелі старадаўныя і больш маладыя. Керамічныя маргелі скарыстоўваліся ў БССР і раней на заводах па вырабу кахлі. Заводы на маргелях чацьвярцёвага пэрыоду былі пабудаваны ў раёне гораду Копыся, а на маргелях крэйдавага пэрыоду ў горадзе Прапойску.

Масыўна крышталёвыя і слаіста крышталёвыя пароды пратэразойскага ўзросту, якія знаходзяцца ў карэнным стане на паверхні зямлі па-за межамі Рэспублікі, на поўнач— у Фінляндыі і на поўдзень—на Украіне,—на тэрыторыі БССР значна паглыбіліся і не дастаюцца зробленымі сьвідраванымі прабоінамі. Магчыма, што яны залягаюць няглыбока ў вадазборы ракі Ўборці, правага прытоку ракі Прыпяці, ля самай паўднёвай мяжы Рэспублікі, дзе яны могуць быць знойдзены на нязначнай плошчы. У той-жа час мы маем колёсальную колькасьць гэтых парод, раскіданых амаль па ўсёй плошчы БССР у стане валуноў крышталёвых парод—так званых эротычных валуноў, розных галечнікаў крышталёвых парод і гравійных матар'ялаў, зьвязаных з дзейнасьцю ледавіка. Гэтыя масы вельмі каштоўных матар'ялаў альбо разьмежаваны на паасобных плошчах (палі валуноў, пласты галечніку ў пяскох і г. д.), альбо згуртаваны ў значнай колькасьці на нязначнай плошчы; сюды належаць канцовыя морэны, озы, некаторыя галечнікі і г. д. У некаторай частцы яны зьяўляюцца ў значнай ступені выветранымі і ня маюць належнай прамысловай каштоўнасьці. Наадварот, сярод

некаторых парод, асабліва кварцытаў, пескавікоў і дробна-зярнёвых гранітаў, мы знаходзім паасобныя кавалкі зусім ня зьмененымі. У некаторых мясцох згуртаваньні валуноў і галькі крышталёвых парод зьмяшчаюць у рознай колькасьці валуны і гальку вапняковых парод сілюрскага і дэвонскага пэрыодаў. Вызначэньне мэтазгоднасьці распрацоўкі гэтых матар'ялаў і падлік запасаў у згуртаваньнях і на паасобных плошчах могуць весьціся толькі на падставе некаторых сярэдніх лічбаў, атрыманых пры вывучэньні адкладаў з увядзеньнем коэфіцыенту запасу. Менш значныя згуртаваньні вычэрпваюцца ў некаторых выпадках на працягу некалькіх гадоў, і іх азначэньне ў сьпісе мае гістарычны характар.

Значна пашыранымі сярод адкладаў паверхневай зоны зьяўляюцца розныя пяскі. У адкладах морскага тыпу дачацьвярцёвага ўзросту ўключаны пласткі роўнамерна-зярнёвых кварцавых пяскоў, у некаторых выпадках лушчаковых (сьлюдзяных) з зернямі гляўконітаў, а ў некаторых выпадках конкрэцыі фасфарытаў. Тут сустракаюцца дробна-зярнёвыя пяскі, як напрыклад, у паселішчы Выдрынка ў 3-х кілёмэтрах ад гораду Клімавіч (абг. № 145), ля вёскі Парадзіна ў адкладах вышэй крэйды, у вадазборы рэчкі Асьленкі і іншых месцах, якія, згодна даных хэмічных аналізаў, зьмяшчаюць больш 97% SiO_2. У адкладах чацьвярцёвага часу сустракаюцца значныя масы пяскоў рознага паходжаньня. Па далінах сучасных рэчных сыстэм і па западзінах азёр згуртаваны алювіяльныя пяскі; сярод адкладаў ледавікоў знаходзяцца флювіягляцыяльныя пяскі, а перад канцовымі морэнамі—зандравыя палі. Зьверху морэны перакрыты надморэнавымі несартаванымі пяскамі, якія зьмяшчаюць валуны і гальку крышталёвых парод і вапнякоў альбо пяскамі эолевага паходжаньня. Апошнія ўтвараюць выдмы (дзюны) і барханы на значных прасторах у межах зандраў і па далінах рэк, багатых плошчамі алювіяльных незадзярнелых пяскоў. Пяскі чацьвярцёвага пэрыоду, за выключэньнем пяскоў зоны падзолу, зьяўляюцца ў большасьці афарбаванымі тленьнікамі жалеза ў розныя адценьні жоўтага, бурага і чырвонага колеру. Яны зьмяшчаюць дамешку зярнят палявых шпатаў, рагавых абманак, лісточкаў лушчаку і ў цэлым шэрагу выпадкаў зьяўляюцца няроўнамерна-зярнёвымі і слаба адсартаванымі. У сьпісе вызначана 53 месцазнаходжаньні розных пяскоў, добра яшчэ ня вывучаных.

З сілікатавых матар'ялаў, знойдзеных у адкладах на тэрыторыі БССР, трэба адзначыць крэмені, трэпелы і апокі.

Крэмені ў карэнным стане вызначаны ў адкладах дэвонскага пэрыоду, дзе яны складаюць пласты нязначнай таўшчыні з паасобных конкрэцый паміж пластамі долёмітаў і долёмітызаваных вапнякоў. У вадазборы ракі Заходняй Дзьвіны, сярод долёмітаў у абгаленьнях ракі вышэй Віцебску і ў вадазборы ракі Дняпра ля Воршы знойдзены такія сьцяжэньні цёмна-шэрага ў белай абалонцы крэменю. Затым нам вядомы конкрэцыі чорнага, бліскучага, з матаваю паверхняю крэменю; у некаторых выпадках сьветлага альбо бура-жоўтага колеру з акладаў крэйды. У апошняй конкрэцыі крэменю таксама складаюць пласткі нязначнае таўшчыні. Вызначана концэнтрацыя сьцяжэньняў і конкрэцый крэмэню сярод галечнікаў у чацьвярцёвых адкладах асабліва ў гальцы па берагох ракі Дняпра ў Воршы і ракі Сажа на значным працягу яго цячэньнія. Практычна ў сучасны момант скарыстоўваюцца толькі крэмені з другапарадкавых заляганьняў у чацьвярцёвых адкладах.

Пры дасьледваньні раёну Копыся ў 1924 годзе, ня гледзячы на тое, што там раней праводзіліся значныя распрацоўкі мясцовай мінэральнай сыравіны на заводах па вырабу кахлі, мною была вызначана ў першы раз наяўнасьць паасобных адкладаў таўшчынёю больш 1,5 мэтраў, якія пры вывучэньні аказаліся складзенымі з астач панцыраў дыятомей некалькіх відаў; яны былі вызначаны спачатку на ўзвышшах левага берагу ракі Дняпра, а потым знойдзены ў тых-жа ўмовах і на правым беразе ракі. Гэтыя пароды зьявіліся тыповымі дыятамітамі і па даных хэмічных аналізаў зьмяшчаюць ад 78,6% да 82,6% нерашчыняемай у кіслотах астачы. Па свайму складу яны зьяўляюцца вельмі каштоўным матар'ялам, на які маецца вялікае запатрабаваньне з боку прамысловасьці. Вывучэньне ўмоў знаходжаньня гэтых трэпелаў у раёне гораду Копыся дае ўпэўненасьць, што аналёгічныя адклады будуць выкрыты ў вадазборы ракі Дняпра і ў другіх мясцох, сярод адкладаў чацьвярцёрага пэрыоду.

Геолёгічнае вывучэньне адкладаў у вадазборы ракі Астра, левага прытоку ракі Сажа, у той яго частцы, якая ўваходзіць у межы БССР, дало мажлівасьць мне ў першы раз у 1926 годзе выявіць прысутнасьць адкладаў так званых апок, вывучэньне якіх было мною праведзена больш дэталёва ў 1928 годзе. Вывучаючы адклады крэйды ў абгаленьнях правага берегу ракі Астра каля вёскі Роськавай і вёскі Стары Дзедзін, а затым і па левым беразе на Крэйдавай гары ля вёскі Іванаўшчына, мною было вызначана, што

белая крэйда ў паверхневай частцы пласту ўзбагачаецца SiO_2 і пераходзіць у так званую апоку. Таўшчыня апок павялічваецца на ўсход, дасягаючы ў в. Іванаўшчыны, у берагавых абгаленьнях больш 0,5 мэтра таўшчыны (абг. № 104). Хэмічнымі аналізамі выявілася, што гэтыя апокі зьмяшчаюць нерашчыняемай астачы ў абгаленьнях каля вёскі Роськавай ад 52,26% да 58,63% і ля вёскі Іванаўшчыны да 82,6%. Апокі вывучаны мною пакуль што толькі ў абгаленьнях берагоў ракі Астра і не прасочаны далей ад берагоў, што можа даць яшчэ больш карысныя вынікі.

Тэрыторыя БССР зьяўляецца багатаю на адклады розных глін, суглінкаў і супесяй. Паколькі паверхневую зону складаюць у большасьці моцныя ледавіковыя адклады, то найбольш пашыранымі зьяўляюцца так званыя морэнавыя суглінкі. Гэта пароды больш-менш чыста гліністыя, плястычныя, розных адценьняў чырвона-бурага альбо шэрага колеру, у некаторых выпадках сіняватага колеру, у большасьці з дамешкаю рознага процанту пяскоў і амаль што заўсёды карбонатныя. Асноўная характарыстыка іх—уключэньне несартаваных матар'ялаў ад пылу, дробных зярнятак да валуноў буйнага памеру. Морэнавыя суглінкі ўжываюцца насельніцтвам і тэхнікай у залежнасьці ад іх складу. Трэба адзначыць, што наогул гэтыя пароды хутка зьмяняюцца і на нязначнай адлегласьці маюць ужо другі склад, у выніку чаго нельга атрымаць значную масу аднолькавага складу. Сярод пэлітаў зьвязаных з адкладамі ледавікоў, асабліва трэба адзначыць знаходжаньне вельмі каштоўных, так званых істужкавых глін, якія павінны быць вылучаны ў асобную групу. У сучасны момант істужкавыя гліны скарыстоўваюцца з посьпехам у шэрагу месц на паўночы БССР. Зьяўляючыся ападкамі ледавіковых вод, істужкавыя гліны даюць сэрыю гадавых пластоў, складзеных вельмі тонка адмучанымі матар'яламі, што адрозьнівае іх ад груба сартаваных матар'ялаў морэнавага суглінку. Гліны, зьвязаныя з карэннымі адкладамі парод дэвонскага, крэйдавага і трацьцёвага пэрыоду, зьяўляюцца рознымі па свайму складу і па сваіх уласьцівасьцях, і паміж імі можна, бязумоўна, адшукаць вельмі каштоўныя для прамысловасьці, але яны залягаюця пад перакрышкаю чацьвярцёвых парод значнай таўшчыні і ў большасьці вызначаюцца толькі пры правядзеньні сьвідраваных прабоін на значнай глыбіні. У тых нямногіх выпадках, калі яны выходзяць у абгаленьнях на земную паверхню альбо набліжаюцца да яе, пажадана самае шырокае вывучэньне іх. Зьяўляючыся адкладамі мора, пласты гэтых глін захоўваюць добра свае ўласьцівасьці

і хэмічны склад, і з іх можна здабыць масу пэўнай якасьці. Да апошняга часу гліны гэтыя скрыстоўваюцца мала.

Перад намі стаіць адно з найбольш важных пытаньняў для Беларусі ў зьвязку з пабудовай на яе тэрыторыі моцных электра-цэнтраляй,—гэта адшуканьне сярод гліністых матар'ялаў руд мэталю алюмінія.

У часе дасьледваньня ўсходняй часткі Аршаншыны ў 1924 г. і 1925 гадох мною была вызначана ў першы раз наяўнасьць паасобных глін сьветла-зялёнага колеру, якія перакрываюць адклады крэйды ля вёскі Парадзінай і якія па іх уласьцівасьцях трэба аднесьці да асобнай групы так званых флёрыдынавых глін. Яны пры зьмешваньні з вадою не даюць плястычнай масы, маюць значныя абсорбуючыя ўласьцівасьці і могуць ужывацца для абсорбаваньня розных компанэнтаў з расьлінных аліваў і нафтаў. Яны таксама могуць зьявіцца напаўняльнікамі пры вырабе мыла, могуць быць скарыстаны і ў шэрагу іншых процэсаў. Гліны з раёну Парадзіна па хэмічнаму складу належаць да лепшых груп клясыфікацыі Бэнсмана. Трэба адзначыць, што да апошняга часу яшчэ не праведзена належнага вывучэньня гэтых адкладаў флёрыдынаў і ня вызначана іх прамысловая каштоўнасьць у завадзкім маштабе.

З пэлітаў трэба адзначыць яшчэ моцныя адклады лёсаў і іх гамолагаў, якія перакрываюць на паверхні і па схілах узвышшаў значныя плошчы і даюць у абгаленьнях адвесныя сьценкі ў некалькі мэтраў. Гэтыя порыстыя, непластовыя сьветла-жоўтага колеру пароды зьяўляюцца вядомымі каштоўнымі глебамі; у прамысловасьці да апошняга часу ўжываюцца зусім слаба. Сюды належыць яшчэ значная група так званых лёсаватых парод, якія зьмяшчаюць ня толькі пылаватыя, але часткай і больш грубыя матар'ялы; у абгаленьнях гэтыя пароды не даюць адвесных сьценак.

Асабліва важнае значэньне для БССР мае знаходжаньне па яе тэрыторыі ў адкладах рознага геолёгічнага ўзросту згуртаваньняў фасфарытаў, якія сустракаюцца ў стане пліты, альбо паасобных канкрэцый рознай велічыні. З адкладаў, вядомых на тэрыторыі БССР, толькі адклады дэвонскага пэрыоду не зьмяшчаюць фасфарытаў, ва ўсіх-жа астатніх, напрыклад, юрскіх, крэйдавых, трацьцёвых і часткай чацьвярцёвых мы знаходзім згуртаваньні фасфарытаў рознага тыпу. Фасфарытавая пліта зьяўляецца пескавіком, цэмантаваным фосфарна-кіслым кальцыем і знаходзіцца ў адкладах сэнаманскага ярусу крэйдавай сыстэмы, якія выходзяць на дзённую паверхню на ўсход ад Мсьціслаўля ля вёсак Гразь,

5672

Бахараўка ды іншых па-за межамі БССР. Па даных хэмічных аналізаў яна зьмяшчае ад 16,26% да 18,48% P_2O_5. Вывучэньне фасфарытавых конкрэцый, зробленае мною па матар'ялах, здабытых у часе палявых досьледаў, сьведчыць аб тым, што мы тут маем конкрэцыі рознага паходжаньня і рознага якаснага складу.

Для сыстэматыкі і належнай клясыфікацыі фасфарытавых конкрэцый мною непасрэдна вызначана некалькі паасобных тыпаў.

Першы тып — гэта фасфарытавыя конкрэцыі цёмнага ды чорнага колеру, гліністыя, без паасобных зярнят пяску, матавыя, у перарэзе з гладкаю, часта бліскучаю паверхняю, даволі добра акатаныя; у шэрагу выпадкаў прасьверленыя фалладамі. Гэтыя конкрэцыі па даных хэмічных аналізаў зьмяшчаюць ад 28,91% да 30,12% P_2O_5. Знойдзены пакуль што як дамешка ў галечніках чацьвярцёвага пэрыоду на Мсьціслаўшчыне.

Другі тып фасфарытавых конкрэцый таксама гліністы, без уключэньня кварцавых зярнят, у перарэзе белы альбо сьветла-шэры, „гроздьевидный" па форме, з паверхні матава-шэры, у некаторых выпадках пакрыты сьветла-бураю паліваю. Па даных хэмічных аналізаў зьмяшчае да 19,61% P_2O_5. Вызначаны мною ў невялікіх згуртаваньнях у адкладах чацьвярцёвага пэрыоду ў вадазборы рэчкі Лабжанкі.

Трэці тып конкрэцый фасфарытаў пяшчаністы, сьветла-шэры, з уключэньнем зярнят гляўконіту; у перарэзе дае пясок і зярняты гляўконіту, цэмантаваныя сьветлым цэмантам фосфарна-кіслага кальцыя; „гроздьевидный" па форме, акатаны ў рознай ступені, з матава-шэраю паверхняй, часткай пакрыты невялікімі плямамі палівы цёмнага колеру. У карэнным стане зьвязаны з адкладамі фасфарытавых конкрэцый у зеленавата-шэрых пяскох сэнаманскага ўзросту, а ў другапарадкавых адкладах знойдзен, як дамешка сярод галечнікаў чацьвярцёвага пэрыоду. Гэты фасфарыт зьяўляецца найбольш бедным і па даных хэмічных аналізаў зьмяшчае ад 11,45% да 16,85% P_2O_5.

Затым вызначан яшчэ цэлы шэраг паасобных тыпаў фасфарытаў у адкладах крэйдавага і трацьцёвага пэрыоду, якія маюць толькі навуковае значэньне.

З усіх паземаў, якія зьмяшчаюць адклады фасфарытаў у стане пліты і паасобных конкрэцый, у сучасны момант мае прамысловае значэньне толькі адзін пазем, які зьвязан з адкладамі сэнаманскага ярусу крэйдавае сыстэмы, хаця ён уключае найбольш бедныя пяшчаністыя фасфарыты. Су-

часнае разгортваньне нашае фасфатавае прамысловасьці ідзе за кошт скарыстаньня гэтых фасфарытаў. Некаторае прамысловае значэньне, больш мясцовага характару, маюць другарадныя згуртаваньні фасфарытавых конкрэцый у адкладах чацьвярцёвага пэрыоду, як напрыклад, у вадазборы рэчкі Лабжанкі.

Нашы больш багатыя гліністыя фасфарытавыя конкрэцыі, якія зьмяшчаюць да 30,12% P_2O_5, па сваёй якасьці ня ўступаюць рыначным сартам Алжырскіх і Туніскіх фасфарытаў, якія зьмяшчаюць ад 26,5% да 31,1% P_2O_5; пажадана, каб далейшыя дасьледваньні выкрылі знаходжаньне гэтых фасфарытаў у карэнным стане і тым далі яшчэ больш магчымасьці разгарнуць гэтую важную для сельскай гаспадаркі галіну прамысловасьці.

Ва ўмовах БССР асабліва важным пытаньнем зьяўляецца магчымасьць здабываньня на месцы пірыту альбо марказыту — мінэраляў, патрэбных у тэхніцы для вырабу сярчанай кіслаты. Вывучэньне адкладаў крэйдавага пэрыоду, праведзенае мною ў габінэце Геолёгічнага Інстытуту, далі магчымасьць вычначыць спачатку, што зялёна-шэрыя пяскі сэнаманскага ярусу ў сваёй масе зьмяшчаюць нязначную колькасьць пірыту ў раскіданым стане. Далейшае вывучэньне паказала, што гэтыя пяскі ў некаторай зоне і ў некаторых мясцох зьяўляюцца больш узбагачанымі пірытам, і зросткі пірыту, якія наогул назіраюцца толькі пры павялічэньні, тут значна павялічваюцца. Выходзячы з гэтага, вядзецца далейшае вывучэньне, якое паступова дае лепшыя вынікі. Так, у адкладах пяскоў альбо пяшчаністай крэйды на Крэйдавай гары ў вадазборы рэчкі Лабжанкі ля гораду Клімавіч, мною быў вызначаны на глыбіні 25,0-26,0 мэтраў прапластак, які згодна даных хэмічнага аналізу паказаў у сваім складзе FeS_2 у 6,62%. З зялёна-шэрых-жа пяскоў крэйдавага пэрыоду сьвідраванаю прабоінай, зробленай Белсельбудам у Старым Быхаве, былі здабыты з глыбіні 60,0 мэтраў зросткі пірыту памерам да 5 сантымэтраў у большай колькасьці. У сучасны момант гэтае пытаньне зьяўляецца тэорытычным і патрабуе далейшага працягу.

Адклады торфа-вугаляў і сапрапэляў у чацьвярцёвых адкладах былі заўважаны геолёгічнымі партыямі, але сцэцыяльна не вывучаліся, дзякуючы чаму вызначана ў сьпісе толькі некалькі месц, у той час як чацьвярцёвыя адклады наогул зьяўляюцца багатымі на гэтыя матар'ялы.

Гляўконітавыя пароды, як вапнякі, гліны і асабліва розныя пяскі, сустракаюцца ў значнай колькасьці паміж карэн-

нымі адкладамі, але пакуль што яны ня вывучаны, для іх не распрацавана належная клясыфікацыя, чаму яны ў складзеным мною сьпісе ня вызначаны ў асобную групу.

З мінэралізаваных крыніц на тэрыторыі БССР да апошняга году былі вядомы — у Баркаўшчызьне і Мяжыцы сярчана-жалезістыя і ў Лагойску — жалезістыя. Сьвідраваньне глыбокіх прабоін у Менску і Бабруйску ў мінулым годзе выявіла, што тут на глыбіні 280-300 мэтраў маецца пазем у пескавіковым ярусе дэвонскага пэрыоду. Ён дае салёную ваду, вельмі каштоўную ў лекавых адносінах.

З гэтага пераліку можна заўважыць, што тэрыторыя БССР багата на розныя нярудныя выкапні. Яны сустракаюцца ў значнай колькасьці і забясьпечваюць разгортваньне многіх відаў прамысловасьці, якія маюць патрэбу ў высокаякаснай мінэральнай сыравіне і даюць сельскай гаспадарцы патрэбныя для яе інтэнсыфікацыі мінэральныя ўгнаеньні, з багатым зьместам вапны, фосфару і калію.

Што да рудных выкапняў, дык праўда, што тут няма асабліва каштоўных выкапняў, якія-б мелі ў сваім складзе мэталі — золата, серабро, медзь, сьвінец ды іншыя, але сярод забалочаных абшараў, па розных сенажацях, у нізінах і поймах рачных сыстэм знаходзяцца раскіданыя на значнай плошчы рудныя згуртаваньні галоўнейшага з мэталяў — жалеза. Тут знаходзяцца розныя віды ліманіту: буры жалязьняк, розныя балотныя і дзярновыя руды, чырвоны жалязьняк, гэматыт, фосфарна-кіслыя злучэньні жалеза, вівіяніт; апошнія два ў параўнаньні з ліманітам у нязначнай колькасьці.

Гэтыя жалезьнякі яшчэ толькі пачаты вывучэньнем і для іх дасьледваньня распрацоўваецца належная мэтодолёгія.

Вывучаючы рудныя выкапні Рэспублікі, я ўпэўнены, мы ўкладаем свае першыя цагліны ў пабудову на працягу другой пяцігодкі гіганта чорнай мэталюргіі, замест тых шматлікіх „рудняў“, якімі калісьці была так багата Беларусь.

ТАБЛІЦА

АГУЛЬНАГА ПАДЛІКУ І РАЗЬМЕРКАВАНЬНЯ ПААСОБНЫХ КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ Б. С. С. Р. ПА РАЁНАХ

ЦНБ им. Я. КОЛАСА
НАН Беларуси

№ па альфабэту	№ па карце	РАЁН	Долёміты і долёміты-заван. вапнякі пластов. 1	Вапнякі пластов. палеозойскага ўзросту 2	Крэйда пішучая, гліністая і г. д. 3	Маргелі старадаўныя розн. геолёгічн. ўзр. 4	Маргелі лугав. і азёрн. чапьвярцёв. пэрыоду 5	Травэрцыны 6	Лёсы 7	Суглінкі розныя 8	Пяскі 10	Граві 11	Галечнікі 12	Валуны крышталёвых парод 13	Валуны вапняковыя 14	Флёрыдыны 15	Фасфарыты 16	Іскракі 17	Крэмені 18	Трэпелы 19	Апокі 20	Жалезьнякі бурыя 21	Гематыты 22	Торфа-вугалі і сапрапэлі 23	Крыніцы мінэралізаваныя 24	Усяго
1	84	Азарыцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	27	Аршанскі	5	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15
3	53	Асіпавіцкі	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
4	2	Асьвейскі	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
5	66	Бабруйскі	—	—	7	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	21
6	21	Багушэўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	31	Барысаўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
8	14	Бешанковіцкі	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
9	4	Боркавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	98	Брагінскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	79	Буда-Кашалеўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
12	57	Быхаўскі	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
13	17	Бягомльскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
14	45	Бялыніцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	44	Бярэзінскі	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5
16	88	Веткаўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	8	Ветрынскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
18	12	Віцебскі	6	1	—	—	—	—	—	3	2	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
19	10	Вульскі	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
20	9	Вушацкі	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
21	15	Высачанскі	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
22	6	Гарадокскі	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
23	76	Глускі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
24	89	Гомельскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	36	Горацкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	63	Грэскі	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

№ па альфабэту	№ па карце	РАЁН	Долёміты і долёміты-заван. вапнякі пластов. 1	Вапнякі пластов. палеозойскага ўзросту 2	Крэйда пішучая, гліністая і г. д. 3	Маргелі старадаўныя розн. геолёгічн. ўзр. 4	Маргелі лугав. і азёрн. чацьвярцёв. пэрыоду 5	Травэртыны 6	Лёсы 7	Суглінкі розныя 8	Гліны 9	Пяскі 10	Граві 11	Галечнікі 12	Валуны крышталёвых парод 13	Валуны вапняковыя 14	Флёрыдыны 15	Фасфарыты 16	Іскракі 17	Крамяні 18	Трэпелы 19	Апокі 20	Жалезьнякі бурыя 21	Гематыты 22	Торфа-вугалі і сапрапэлі 23	Крыніцы мінэралізаваньня 24	Усяго
27	37	Дрыбінскі	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28	1	Дрысенскі	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
29	28	Дубровенскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
30	78	Жлобінскі	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	14
31	68	Журавіцкі	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
32	81	Жіткавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
33	38	Заслаўскі	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
34	99	Камарынскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	83	Капаткевіцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	62	Капыльскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
37	93	Каралінскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	69	Кармянскі	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	12
39	71	Касьцюковіцкі	—	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	20
40	61	Клімавіцкі	—	—	17	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	3	2	—	—	—	—	32
41	55	Клічаўскі	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
42	41	Койданаўскі	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
43	34	Капыскі	—	—	—	—	7	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13
44	26	Коханаўскі	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
45	70	Краснапольскі	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
46	33	Круглянскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	32	Крупскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	60	Крычаўскі	—	2	10	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	24
49	30	Лагойскі	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	9
50	92	Лельчыцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	18	Лепельскі	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
52	97	Лоеўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

№ па альфабэту	№ па карце	РАЁН	Долёміты і далёміты-заван. вапнякі пластов. 1	Вапнякі пластов. палеозойскага ўзросту 2	Крэйда пішучая, глінистая і г. д. 3	Маргелі старадаўныя розн. геолёгічн. ўзр. 4	Маргелі лугав. і азёрн. чацьвярцёв. пэрыоду 5	Травэрцыны 6	Лёсы 7	Суглінкі розныя 8	Гліны 9	Пяскі 10	Граві 11	Галечнікі 12	Валуны крышталёвых парод 13	Валуны вапняковыя 14	Флёрыдыны 15	Фасфарыты 16	Іскракі 17	Крамяні 18	Трэпелы 19	Апокі 20	Жалезьнякі бурыя 21	Гематыты 22	Торфа-вугалі і сапрапэлі 23	Крыніцы мінэралізаваныя 24	Усяго
53	47	Лупалаўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	75	Любаньскі	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
55	29	Ляднянскі	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
56	16	Лёзьнянскі	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
57	46	Магілеўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	85	Мазырскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
59	39	Менск	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
60	50	Мсьціслаўскі	—	—	5	—	—	1	4	2	—	1	—	—	—	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
61	7	Межанскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
62	94	Нараўлянскі	—	—	—	—	3		—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9
63	77	Парыцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
64	82	Петрыкаўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
65	22	Плешчаніцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
66	5	Полацкі	—	—	—	—	—	—	—	1	13	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
67	58	Прапойскі	3	—	6	2	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4	—	—	—	—	22
68	52	Пухавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
69	67	Рагачэўскі	—	—	2	—	—	—	—	7	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15
70	3	Расонскі	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7
71	49	Расьнянскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	86	Рэчыцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
73	11	Сіроцінскі	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
74	64	Слуцкі	—	—	2	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8
75	40	Смалявіцкі	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
76	65	Стара-Дароскі	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
77	74	Старобінскі	—	—	1	—	1	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12
78	13	Сураскі	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

№ па альфабэту	№ па карце	РАЁН	Долёміты і долёміты-заван. вапнякі пластов.	Вапнякі пластов. палеозойскага ўзросту	Крэйда пішучая, глінстая і г. д.	Маргелі старадаўныя розн. геолёгічн. ўзр.	Маргелі лугав. і азёрн. чацьвярцёв. пэрыоду	Травэрцыны	Лёсы	Суглінкі розныя	Гліны	Пясы	Граві	Галечнікі	Валуны крышталёвых пород	Валуны вапняковыя	Флёрыдыны	Фасфарыты	Іскракі	Крамяні	Трэпелы	Апокі	Жалезьнякі бурыя	Гематыты	Торфа-вугалі і сапрапэлі	Крыніцы мінэралізаваныя	Усяго
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79	54	Сьвіслацкі	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7
80	42	Сьмілавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	20	Сеньнскі	—	—	—	—	3	—	—	3	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
82	25	Талачынскі	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
83	91	Тураўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	87	Уваравіцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	51	Узьдзенскі	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
86	23	Халопеніцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
87	96	Хойніцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
88	72	Хоцімскі	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8
89	90	Церахоўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	48	Чавускі	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
91	24	Чарэйскі	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
92	56	Чачавіцкі	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
93	80	Чачэрскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	19	Чашніцкі	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
95	14	Чырвона-Слабадзкі . . .	—	—	2	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
96	43	Чэрвенскі	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
97	59	Чэрыкаўскі	—	—	10	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	16
98	84	Шклоўскі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
99	95	Юравіцкі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		Усяго . . .	23	3	86	16	26	1	4	75	76	2	7	16	26	37	2	18	2	6	2	3	36	2	3	5	527

РЭГІСТРАЦЫЙНЫ СЬПІС
карысных выкапняў БССР
(па раёнах)

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 1—84 [1]). Азарыцкі раён.			
				№ 2—27. Аршанскі раён.			
1	233	Долёміт палеозойскі	в. Кабялякі	Долёміты знаходзяцца ў абгаленьні правага берагу ракі Дняпро ля в. Кабялякі; складаюць таксама да 0,5 м вышыні, уступ якой праходзіць па дну ракі амаль да другога берагу і шэраг паасобных парогаў. Уступ дае вадаспад. На плыні ракі па праваму яе берагу шмат рознага памеру ям, з якіх сяляне выбіралі долёміт.	6	№ 34—36	Нязначныя сялянскія распрацоўкі ямамі
2	229	Долёміт палеозойскі	г. Орша	У абгаленьні правага берагу ракі Дняпро па цячэньні ніжэй казённага сьпірытусавага заводу, там, дзе да ракі падыходзіць досыць глыбокі актыўны раўчак, знаходзім пласткі бура-жоўтага і жаўтавата-шэрага сітаватага долёміту і долёмітызаваных вапнякоў, у якіх уключаны тры прапластаваньні крэменю. Долёміты і вапнякі палеозойскага ўзросту даюць тут тоўшчу да 8-9 м, якую магчыма скарыстаць, бо яна выходзіць вышэй узроўню паверхні вады ў рацэ Дняпро і перакрыта іншымі пародамі, дасягаючы некалькіх мэтраў таўшчыні. Пласткі ад вады маюць нахіл і далей паглыбляюцца. Адклады зьмешчаныя і запас абмежаваны. Па даных	6	№ 4, 6, 7, 9—15	н. р.

[1]) 1-я лічба—нумар раёну па альфабэту; 2-я лічба—нумар раёну па карце.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				колькасных хэмічных аналізаў, зробленых у Хэмічным Інстытуце БАН, долёміты і долёмітызаваныя вапнякі з гэтага абгаленьня маюць ад 54,11% да 69,79% $CaCo_3$ і ад 20,90% да 39,36% $MgCo_3$ (х. а. № 49—54)			
3	231	Долёміт палеозойскі	г. Ворша	Долёміты знаходзяцца ў абгаленьні абодвух берагоў рэчкі Аршыцы ля ўтоку яе ў раку Дняпро. Воды гэтай рэчкі зрабілі ў долёмітах калідор глыбінёю ў некалькі мэтраў, чым далі магчымасьць, вывучаць непасрэдна розныя часткі гэтае тоўшчы. Запас абмежаваны; навокал усё занята сялібамі.	6	№ 17	н. р.
4	232	Долёміт палеозойскі	г. Ворша	Долёміты палеозойскага ўзросту абгаляюцца па левым беразе ракі Дняпро ніжэй драўлянага маста на шашы Ворша-Магілеў у мясцовасьці, занятай сялібамі. Запас абмежаваны.	6	№ 32	н. р.
5	230	Долёміт палеозойскі	г. Ворша	Долёміты палеозойскага ўзросту абгаляюцца на значнай плошчы правага берагу ракі Дняпро і крыху ніжэй па цячэньні ракі ад гораду Воршы. Розныя пласткі долёмітаў афарбаваны ў розны колер, маюць розны хэмічны склад і часткай знаходзяцца вышэй узроўню паверхні вады ў рацэ Дняпро, а часткай ніжэй. Плошча ў значнай ступені ўжо распрацавана ранейшымі горнымі работамі. Абгаленьне значна папсавана; запас вапняку невядомы.	6	№ 2-3	Абгаленьне распрацована ў значнай ступені

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
6	251	Маргель	в. Антонаўка	Маргель знаходзіцца ў тым самым раўчаку, які праходзіць праз в. Лёшчу. Абгаленьне маргелю ў в. Антонаўка знаходзіцца ў адлегласьці 0,25 км ад в. Лёшчы. Маргель не дасьледваны, бо работы ўсе былі завалены.	6	№ 71	Распрацоўваўся
7	252	Маргель	в. Берасьцянёва	Пад слайком суглінкаў знаходзіцца пласток цёмна-шэрага значна пескаватага маргелю ля в. Берасьцянёвай на правым беразе р. Дняпро.	14	№ 1-2	н. р.
8	253	Маргель	в. Берасьцянёва	Маргель мае значнае разьвіцьцё і на левым беразе ракі Дняпро супроць в. Берасьцянёвай.	14	№ 3	н. р.
9	258	Валун вапняковы	г. Ворша	Кар'еры для набываньня вапняковага валуну і галькі розных памераў для апалу на вапну ў напольных пячах знаходзяцца вышэй г. Воршы па ўзвышшы правага берагу ракі Дняпро. Збор вапняковага каменьня робіцца таксама і на плёсах ракі.	6	—	Распрацоўваюць для апалу на вапну
10	264	Валун вапняковы	г. Ворша	У розных мясцох у межах самага гораду раней набывалі вапняковыя валуны і галькі для апалу на вапну. У сучасны момант у значнай ступені вапнякі распрацаваны і работы спынены.	6	—	н. р.
11	263	Валун вапняковы	в. Пустынька.	У нязначнай колькасьці сустракаюцца вапняковыя валуны і галькі ў адкладах правага берагу ракі Дняпро ля в. Пустынькі.	6	—	н. р.
12	262	Валун вапняковы	В. Навасёлкі	Валуны і галька вапнякоў і долёмітаў сустракаюцца ў невялікай колькасьці ў адкладах правага берагу ракі Дняпро.	14	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
13	238	Гліна	в. Вусьце на р. Дняпро	Гліна вельмі пластычная, слаба-карбонатная, чакалядная колеру, таўшчынёю ў 1 м. Перакрыша 1,0 м; падсьцілае буравата-жаўтаватага колеру слаба глініты пясок. Працяг значны да 1 клм па праваму берагу пойменай тэрасы ракі Дняпро.	6	№ 49	н. р.
14	234	Суглінак морэнавы	г. Ворша	Чырвона-буры морэнавы суглінак складае значную масу ўзвышшаў правага берагу р. Дняпро. Абгаляецца ў ваколіцах гораду ў розных мясцох.	6	№ 41	Распрацоўваецца цагельнямі
15	255	Крэмень	г. Ворша	Крэмень сустракаецца ў стане 3-х прапластаваньняў сярод дэвонскіх вапнякоў і долёмітаў у абгаленьні ніжэй сьпірытусавага заводу па правым беразе р. Дняпро. Прапластаваньні гэтыя нязначнай таўшчыні, наогул да 0,12 м. Крэмень у іх прадстаўляе шэраг паасобных конкрэцый, раскладзеных у радок і нязьвязаных паміж сабой. Ніжэй па рацэ на левым беразе адклады маючыя крэмень, распрацоўваюцца насельніцтвам.	6	№ 5, 6 і 8	н. р.
				№ 3—53. Асіпавіцкі раён.			
1	4	Долёміт палеозойскі	в. Стаішча	Абгаленьне долёмітаў, вызначанае непасрэдна на S ад вёскі Стаішча на плошчы да 0,25 га, паказвае, што долёміты знаходзяцца тут на глыбіні 0,3-0,4 м, а часткай у выглядзе аблому пракідваюцца на паверхні зямлі. Таўшчыня іх больш 0,85 м.	40	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	421	Долёміт палеозойскі	в. Стаішча	Другое абгаленьне долёмітаў вызначана ва ўрочышчы Жаўняк у 2-х кілёмэтрах ад урочышча Мачынск. Долёміты пройдзены толькі на 3,1 мэтру. Агульная таўшчыня іх ня вызначана. Перакрыша 0,3 м. Плошча пашырэньня ня вызначана.	30	—	н. р.
3	422	Долёміт палеозойскі	в. Стаішча	Трэцяе абгаленьне долёмітаў знаходзіцца на адлегласьці 1 клм на ўсход ад урочышча Жаўняк або 3 клм на ўсход ад урочышча Мачынск.	30	—	н. р.
4	12	Гліна	в. Жазьлянка	На правым беразе р. Сьвіслачы ў 2 клм на S ад вёскі Азярышча ў ваколіцах вёскі Жазьлянкі вышла гліна, не дасьледваная да апошняга часу.	—	—	—
5	22	Суглінак морэнавы	в. Лапічы	У ваколіцах вёскі Лапічы на значнай плошчы знаходзіцца чырвона-буры морэнавы суглінак.	39	—	Сялянскія распрацоўкі ямамі
6	23	Суглінак морэнавы	в. Азярыш	Чырвона-буры морэнавы суглінак знаходзіцца ў абгаленьнях у некалькіх мясцох ля вёскі Азярышча.	39	—	Сялянскія распрацоўкі ямамі
7	24	Суглінак морэнавы	в. Вязьзе	Суглінак сустракаецца на значнай плошчы; выходзіць у абгаленьнях і знаходзіцца пры ўглубцы калодзежаў.	39	—	Распрацоўка сялянамі ў нязначным маштабе
				№ 4—2. Асьвейскі раён.			
1	293	Маргель азёрны	в. Ельніца	У адлегласьці 1,0—2,0 клм на N ад вёскі Ельніцы на беразе возера Белага пад пластом торфу да 0,5 мэтра таўшчыні залягае на ўзроўні ніжэй паверхні вады ў возеры	33	№ 27	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А.	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				пласток азёрнага маргелю, таўшчынёю больш 0,5 мэтра. Плошча ня вызначана.			
2	294	Валун крышталёвых пород	м. Асьвея	Па ўзвышшах у ваколіцах мястэчка Асьвея ў абгаленьнях выяўляюцца грубыя чырвонабурага колеру пяскі, маючыя значны процант валуноў і галькі крышталёвых пород і вапнякоў.	33	№ 29	н. р.
				№ 5—66. Бабруйскі раён.			
1	423	Крэйда	в. Гарадзец	На мяжы поймы правага берагу р. Сушы і палёў у адлегласьці 2 клм ад в. Гарадзец ніжэй па рацэ пад пяскамі таўшчынёю 1,0—1,5 м, знойдзены адклады крэйды на плошчы 2-3 га.	11	№ 9	н. р.
2	424	Крэйда	в. Селішча	У адлегласьці 2 клм на N ад вёскі Селішча ва ўрочышчы Ступіцкі Лужок пад перакрышаю да 1,7 мэтра на плошчы каля 1 га знойдзены адклады крэйды. Крэйда ня вывучана.	11	№ 8	н. р.
3	1	Крэйда	в. Кастрыцкая Слабодка	У адлегласьці 1,0 клм на О ад вёскі Кастрыцкая Слабодка на ўзвышшы ў кар'еры знаходзіцца абгаленьне крэйды да 6,0 мэтраў таўшчыні. Верхняя паверхня крэйды няроўная. Яе тоўшча мае ўхіл на N ад 14° да 34°. Перакрыша ў залежнасьці ад гэтага розная, ад 2,5 да 5,0 і больш мэтраў.	10	№ 50—60	Распрацоўваецца другое стагодзьдзе
4	425	Крэйда	в. Пацава Слабада	На левы бок ад дарогі з вёскі Кастрыцкай Слабады праз крэйдавы кар'ер на выселкі вёскі Пацавай Слабады	10	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				ў лесе выяўлена крэйда. Перакрыша 1,5—2,0 мэтра. Таўшчыня крэйды яшчэ ня вызначана.			
5	426	Крэйда	в. Казулічы	Адклады крэйды знаходзяцца на плошчы шырокае западзіны паміж двох радоў узвышшаў ва ўрочышчы „Шырокая Копань". Крэйда пройдзена на 2,5 мэтра; перакрыша 4,5 м. Залягае крэйда ніжэй узроўню грунтовых вод.	10	—	Раней распрацоўвалася сялянамі
6	2	Крэйда	в. Кісялёвічы	Ля вёскі Кісялёвічы знаходзіцца стары кар'ер для распрацоўкі крэйдавых адкладаў, у якім работы праводзяцца ў сучасны момант. Таўшчыня адкладаў крэйды ня вядома, аднак, больш 2,0 — 3,0 м. Перакрыша з пяскоў і суглінкаў у некалькі мэтраў таўшчыні. Паверхня крэйды няроўная. Крэйда падае на N—NO пад кутом 35—40°.	35	—	Распрацоўваецца
7	427	Крэйда	в. Маяк	У старым кар'еры знаходзяцца адклады крэйды, таўшчынёю больш 2-х мэтраў. Тоўшча крэйды ніжэй грунтовых вод ня вызначана. Перакрыша ад 0,4 да 5,0 м, дзякуючы таму, што паверхня крэйды няроўная. Пашырэньне крэйды ў ваколіцах вёскі яшчэ ня вывучана.	35	—	Распрацоўваецца
8	428	Пясок	в. Берасьнёўка	Значнае пашырэньне ў ваколіцах вёскі маюць жоўтыя бязгалечныя баравыя пяскі, якія лёгка перамяшчаюцца паветрам, бо на значнай плошчы яны не пакрыты расьлінасьцю.	35	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
9	429	Пясок	в. Кастрыцкая Слабодка	У крэйдавым кар'еры ў верхняй яго частцы ля правага борту знойдзены моцныя гляўконітавыя зеленавата-шэрыя пяскі. Пакуль што забоем узяты да глыбіні 3,55 мэтраў. Працяг забою да 15,0 мэтраў.	10	№ 135—148	н. р.
10	430	Пясок	в. Кастрыцкая Слабодка	Зеленавата-шэрыя гляўконітавыя пяскі таўшчынёю 11,25 мэтра на дарозе з лесу ў вёску Кастрыцкая Слабодка. Знаходзяцца пяскі на ўзвышшы і выпілі непасрэдна на паверхню.	5	№ 23—43	н. р.
11	431	Пясок	в. Кісялевічы	У кар'еры адначасова з крэйдай заўважаны адклады зеленавата-шэрых гляўконітавых пяскоў, якія залягаюць няглыбока, але падаюць узгоднена з крэйдай.	35	—	н. р.
12	432	Гліна	в. Селішча	На ўзгорку ў адлегласьці 2 клм на N ад вёскі Селішча ва ўрочышчы Ступіцкі Лужок пад расьлінным пластком на плошчы 1,0—1,5 га залягае чырвоная, плястычная, бяз галькі і валуноў гліна. Таўшчыня гліны, велічыня плошчы і перакрыцьцё ня вывучаны.	11	№ 6	н. р.
13	433	Гліна	в. Ясны лес	У нізіне на W ад вёскі Ясны Лес у адлегласьці да 0,5 кілёмэтра на плошчы ад 2 да 3 га знаходзіцца гліна сіва-попельнага колеру таўшчынёю 1,5 мэтра. Перакрыша 0,5 мэтра.	11	№ 2—3	Пабудаваная ў 1903 г. цагельня працавала 3 гады
14	27	Гліна	в. Кісялевічы	У адлегласьці 1,0 клм на О ад в. Кісялевічы ў лесе ёсьць адклады плястычнае	35	—	Сялянскія распрацоўкі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				гліны, якая ўжываецца жыхарамі для вырабу пасуды. Адклады не дасьледваны.			
15	477	Фасфарыты	в. Кастрыцкая Слабодка	Фасфарытавыя конкрэцыі знойдзены ў двох розных горызонтах у кар'еры адначасова з адкладамі крэйды. Першы горызонт фасфарытавых конкрэцый разам з крэмнямі залягае ў сьветла-жоўтых пяскох, перакрываючых крэйду. Другі горызонт складаюць конкрэцыі фасфарыту другога тыпу, якія знаходзяцца ў зеленавата-шэрых гляўконітавых пяскох, падлягаючых крэйдзе. У вывучаным месцы згуртаваньне фасфарытаў невялікае.	10	—	н. р.
16	478	Фасфарыты	в. Кісялевічы	У зеленавата-шэрых гляўконітавых пяскох, падлягаючых адкладам крэйды, знойдзены фасфарытавыя конкрэцыі. Колькасьць ня вызначана.	35	—	н. р.
17	434	Суглінак морэнавы	в. Ала	На S ад вёскі Ала ў адлегласьці 300 клм на плошчы каля 2 га сустракаецца моренавы чырвона-буры суглінак таўшчынёю звыш 1,5 м пад пластком пяску ў 1,0 мэтра таўшчыні.	11	№ 5	Сялянскія распрацоўкі ямамі
18	14	Суглінак морэнавы	в. Любонічы	Суглінак не дасьледваны.			
19	435	Суглінак морэнавы	м. Дабысна	У некалькіх мясцох вызначаецца пашырэньне чырвона-бурага морэнавага суглінку, які ўжываецца для вырабу цэглы жыхарамі мястэчка.	35	—	Раней існавала цагельня
20	18	Суглінак морэнавы	в. Папляавец	Умовы знаходжаньня не вывучаліся.			

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
21	485	Крыніца мінэралізаваная	г. Бабруйск	Сьвідраваная прабоіна № 1 бабруйскага гарадзкога вадаправоду на левым беразе рэчкі Бабруйкі ў межах гораду зроблена да глыбіні 289,9 мэтраў. Гэтая прабоіна дасягнула найбольш глыбокіх вядомых нам паземаў пескавіковага паверху сярэдняга дэвону і дала самазьліў салонае вады. Па папярэдніх хэмічных аналізах, зробленых Хэмічным Інстытутам БАН вада гэтая мае ад 15,44 гр да 16,15 гр цьвёрдае астачы пры 110° С., ад 9,40 гр да 10,03 гр NaCl і ад 0,94 да 1,10 гр серна-кіслых соляй на 1 літар вады. Па даных гэтых хэмічных аналізаў вада зьяўляецца слаба салонаю ў адносінах да ўтрыманьня хлёрыстага натру, і пры ўтрыманьні яшчэ другіх соляй, як, напр., серна-кіслых, трэба лічыць, што гэтая вада павінна быць каштоўнай пры ўжываньні яе з лекавымі мэтамі.	42	—	Праводзіцца вывучэньне
				№ 6—21. Багушэўскі раён.			
1	500	Валун крышталёвых пород	в. Пасады	Валуны крышталёвых пород заўважаны непасрэдна на плошчы, занятай вёскай Пасады, а таксама ў яе ваколіцах.	26	—	н. р.
2	501	Валун крышталёвых пород	в. Вышняе Забароўе	Валуны крышталёвых пород раскіданы на палёх у западзінах паміж бугрынамі на W ад вёскі Вышняга Забароўя паміж дарогай на вёску Буды і трыгономэтрычнай вышкай.	26	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	502	Галечнік	в. Пасады	Галечнік сустракаецца на палёх непасрэдна ў ваколіцах в. Пасады; мае памер ад 0,1 да 0,15 мэтра; часьцей больш дробны. Сярод галькі назіраецца 25—30% вапнякоў і пескаватых долёмітаў.	26	№ 95	н. р.
4	509	Галечнік	в. Вішняе Забароўе	Прыблізна 1,5 клм на W ад вёскі Вышняга Забароўя знаходзіцца плошча памерам да 2 га, на якой пашыраны галечнік крышталёвых пород.	26	№ 98	н. р.
5	504	Пясок гравіевы	ст. Багушэўская	Значная тоўшча шэрага пяску, уключаючага лінзы галечна-гравіевага матар'ялу галоўнейшых крышталёвых пород, хаця ў некаторых выпадках да 30% прыпадае на гальку вапнякова-долёмітавых пород, выходзіць у абгаленьні чыгуначнага кар'еру ля ст. Багушэўская. Кар'ер мае працяг да 400 м пры вышыні забою ад 9 да 4 м. Перакрыты шэры пясок морэнавым суглінкам да 1,0 мэтра таўшчынёю альбо баравымі пескамі.	26	№ 87—89	Распрацоўваецца на баляст для чыгункі
6	505	Пясок	в. Нярэйша	Пясок займае значную плошчу на шляху з вёскі Нярэйша ў вёску Падборыцу, але асабліва адзначаецца ва ўзвышшы на N ад вёскі Нярэйша ў адлегласьці 2 клм. Таўшчыня пяску 1,5—2,0 м. Знаходзіцца пясок на паверхні зямлі.	26	№ 102—104	н. р.
				№ 7—31. Барысаўскі раён.			
1	44	Валун вапняковы	в. Чарніца	У ваколіцы в. Чарніцы раскіданы на палёх у значнай колькасьці вапняковыя валуны і галька.	36	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месца знаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	36	Буры жалязьняк	в. Мурава	Пры ўтоку ракі Бабра ў раку Бярозу на значнай забалочанай пойме гэтых рэк знаходзяцца адклады бурага жалезьняку на глыбіні ад 1,25 да 1,0 м на працягу цячэньня ракі Бярозы амаль што на 20 клм і па рацэ Бабру на 15 клм Як заўсёды, адклады зьменныя ў таўшчыні і часта пераходзяць у паасобныя згуртаваньні.	42	—	—
				№ 8—14. Бешанковіцкі раён			
1	59	Суглінак морэнавы	в. Кракава	Суглінак морэнавы чырвона-бурага колеру, не дасьледваны.	42	—	н. р.
2	53	Суглінак морэнавы	в. Бешанковічы	Марэнавы чырвона-буры суглінак з малой колькасьцю валуноў вышаў у абгаленьні правага берагу р. Заходняй Дзьвіны. Не дасьледваны.	42	—	н. р.
3	332	Суглінак морэнавы	в. Дашкава	Морэнавы суглінак назіраецца па ўзвышшах з бакоў бальшаку на плошчы ў некалькі дзесяткаў гектараў таўшчынёю больш 2,5 м.	26	№ 270	н. р.
4	333	Граві	в. Сьвяча.	Граві крышталёвых пород сустракаецца ва ўрочышчы Гараватка пад глебай 0,2 метра і мае таўшчыню з пяскамі да 6,0 м.	16	—	н. р.
5	334	Граві	в. Добрашава	Граві крышталёвых пород знаходзіцца пад глебавым пластом у 0,6 м і мае таўшчыню 3,0—3,5 м.	16	—	н. р.
6	335	Граві	в. Чорнагосты	Граві крышталёвых пород залягае з паверхні зямлі пластом у 1,5 мэтра таўшчыні на плошчы каля 1,0 га.	16	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцанаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
7	336	Валун крышталёвых пород	в. Буднікі	Валун крышталёвых пород распаўсюджаны па палёх у ваколіцах в. Буднікі найбольш ва ўрочышчы Заспа.	16	—	Сялянскія распрацоўкі
				№ 9—4. Боркавіцкі раён.			
				№ 10—98. Брагінскі раён.			
				№ 11—79. Буда-Кашалеўскі раён.			
1	20	Гліна	в. Люшава	Гліна і ўмовы яе знаходжаньня яшчэ не вывучаліся.	42	—	н. р.
2	19	Гліна	м. Буда-Кашалеўская	Гліна знаходзіцца ў ваколіцах м. Буда-Кашалеўская ў 0,5 клм ад сяліб. Плошча значная.	42	—	Сялянская распрацоўка
				№ 12—57. Быхаўскі раён.			
1	410	Крэйда	в. Лазарэвічы	Значныя адклады крэйды па ўвалах правага берагу р. Дняпра вышэй узроўню вады ў рацэ, перакрытыя іншымі пародамі ад 0,5 да 5,0 мэтраў агульнае таўшчыні.	35	—	Мелюць крэйду
2	527	Іскрак	г. Стары Быхаў	Сьвідраванаю прабоінаю № 80 у г. Старым Быхаве выяўлены ў крэйдзе прапластак, маючы конкрэцыі пірыту да 5,0—6,0 сантымэтраў памерам. З адной прабоіны ўзята значная колькасьць конкрэцый. Пытаньне аб знаходжаньні іскраку ў адкладах крэйды патрабуе далейшага вывучэньня.	42	№ 80	н. р.
				№ 13—17. Бягомльскі раён.			
1	41	Валун вапняковы	в. Трэмбін	Згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў грубых пяскох. Не дасьледваны.	36	—	—

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	38	Валун вапняковы	в. Ёрзаўка	Досыць значнае згуртаваньне вапняковых валуноў у морэнавых адкладах ля в. Ёрзаўкі адзначаны па даных літаратурных крыніц. Згуртаваньне не дасьледвана.	19—36	—	н. р.
3	40	Валун вапняковы	в. Ліпск	Досыць значнае згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў грубазярнёвых гравіевых пяскох. Не дасьледвана.	36	—	—
4	396	Валун вапняковы	в. Берасьнёўка	Згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ля вёскі Берасьнёўкі ў 82 клм ад г. Барысава. Не дасьледвана.	42	—	Расцрацоўваецца
5	39	Валун вапняковы	в. Волча	Згуртаваньне вапняковых валуноў знойдзена зьвязаным з адкладамі морэны ў ваколіцах в. Волча.	19—36	—	—
				№ 14—45. Бялыніцкі раён.			
				№ 15—44. Бярэзінскі раён.			
1	37	Маргель лугавы	в. Калюжыца	Даўно вядомыя адклады лугавога маргелю таўшчынёю да 1,5 м на плошчы, прыблізна, аднаго га маюць па падліках дасьледчыкаў запасу да 28 міль. клг маргелю. Адклады часткай папсаваны ранейшымі распрацоўкамі.	19—22	—	Распрацоўваюцца
2	397	Маргель лугавы	в. Машчаніца	Выяўлена знаходжаньне адкладаў лугавога маргелю ў кар'ерах ля дарогі пры пераезьдзе праз р. Ушу ля вёскі Машчаніцы. Адклады не дасьледваны.	22	—	Раней праводзілася распрацоўка
3	35	Буры жалязьняк	в. Пысюта	Буры жалязьняк знойдзены паасобнымі згуртаваньнямі па правым беразе р. Ушы бліз вёскі Пысюта.	42	—	—

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А.	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
4	398	Валун вапняковы	в. Брадзец	У адлегласьці 2 клм на О ад в. Брадзец знаходзіцца значнае згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў выглядзе выцягнутых у адным напрамку ўзвышшаў. Адклады не вывучаліся.	11—17	№ 20	Распрацоўваецца
5	399	Суглінак морэнавы	в. Брадзец	Чырвона-буры морэнавы суглінак з валунамі і галькай крышталёвых пород знойдзены ў адлегласьці 1 клм. на NW ад в. Брадзец ва ўрочышчы Бродчык на плошчы 2-3 га.	11	№ 21	н. р.
				№ 16—88. Веткаўскі раён.			
				№ 17—8. Ветрынскі раён.			
1	295	Валун крышталёвых пород	в. Шпіньківа	Валуны крышталёвых пород у значнай колькасьці адзначаны ў ваколіцы в. Шпіньківай.	21	—	—
2	296	Валун крышталёвых пород	в. Гурнаполь	Валуны і галькі крышталёвых пород у значнай колькасьці знойдзены ў ваколіцы в. Гурнаполь.	21	—	—
3	297	Валун крышталёвых пород	в. Канашы	Валуны крышталёвых пород у вялікай колькасьці знойдзены ў ваколіцы в. Канашы.	21	—	—
4	272	Валун вапняковы	м. Гомель	Больш значнае згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі заўважана было яшчэ раней у ваколіцы г. Гомелю.	36	—	—
5	298	Гліна	в. Троіцкае	Гліна істужкавая таўшчынёю да 2 мэтраў моцна карбонатная сустракаецца на плошчы да 5 га ля в. Троіцкае.	—	№ 179	—
6	299	Гліна	в. Калдуны	Гліна чырвона-бурая, пластычная таўшчынёю больш 2,0 мэтраў залягае на плошчы 8,0 га каля в. Калдуны.	21	№ 194	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
7	300	Гліна	в. Салаткі	Чырвона-бурага колеру плястычная гліна сустракаецца на плошчы больш 1,0 га ў ваколіцах в. Салаткі і в. Паметнікі на р. Вушач.	—	№ 209	—
8	301	Гліна	в. Рудня	Вельмі плястычная чырвона-бурага колеру гліна таўшчынёю больш 1,5 мэтраў залягае на плошчы 2-3 га ля в. Рудня на р. Вушач.	21	№ 212	Раней была цагельня
				№ 18—12. Віцебскі раён.			
1	337	Долёміт палеозойскі	в.в. Цякава і Лушчыха	Долёміты даюць абгаленьне па правым беразе р. Заходняй Дзьвіны паміж в.в. Цякавай і Лушчыхай на працягу 1,0 клм паласою ў 10—20 м пры таўшчыні да 1,0 м. Па даных хэмічных аналізаў, зробленых Хэмічным Інстытутам БАН, долёміты Заходняй Дзвіны маюць ад 50,54% да 54,75% $CaCo_3$ і ад 36,25% да 42,96% $MgCo_3$ пры нерашчыняемай астачы ўсяго ад 0,82% да 2,82%. Па колькасьці гэтыя абгаленьні долёмітаў зьяўляюцца найбольш значнымі на Беларусі і распрацоўваюцца для апалу вапны і для атрыманьня крышанага матар'ялу на вапнаваньне глебы.	1,27	—	—
2	338	Долёміт палеозойскі	в. в. Драўнева і Цякава	Долёміты складаюць дно і абодва берагі ракі Заходняй Дзьвіны паміж в. в. Драўнёвай і Цякавай, працягам да 1 кілёмэтра па бічэўніку ракі шырынёю ад вады да перакрышы іх іншымі пародамі ў 15,0—20,0 мэтраў пры таўшчыні ад 0,5 да 1,0 мэтра.	1,27	абг. № 4.	—

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	47	Долёміт палеозойскі	в. Койчава і Драўнева	Долёміты вызначаюцца ў абгаленьнях абодвух берагоў ракі Заходняй Дзьвіны паміж вёскамі Койчавай і Драўневай на працягу па бічэўніку ракі каля 1,0 клм паласою ў 10,0—15,0 м шырыні, таўшчынёю ад 0,2 да 0,6 м.	1,27	абг. № 3	—
4	48	Долёміт палеозойскі	в. Падбярэзьзе і Рубы	Долёміты выходзяць на паверхню паласою на працягу бічэўніку ракі 1,0 кілёмэтра; шырынёю ад 16,0 — 25,0 м; таўшчынёю ад 1,0 да 2,5 м па абодвух берагох ракі Заходняй Дзьвіны. Трохі вышэй в. Рубы долёміты ўтвараюць па рацэ парогі.	1,27	абг. № 2	Распрацоўваюцца
5	339	Долёміт палеозойскі	в. Вярхаўе	Долёміты заўважаны на левым беразе р. Заходн. Дзьвіны супроць в. Вярхаўе трохі ніжэй сечкі № 3 у абгаленьні па бічэўніку ракі, таксама ўздымаючыся ад ракі далей тэрасамі. Плошча абгаленьня долёмітаў: 200 м даўжыні па бічэўніку ракі і 50,0 м шырыні. Таўшчыня долёмітаў ад 2,5 да 3,0 м.	1,27	абг. № $^1/_2$	Распрацоўваюцца
6	49	Долёміт палеозойскі	в. Слабада і в. Аўдзеевічы	Долёміты зьявіліся на паверхні зямлі паміж в. в. Слабада і Аўдзеевічы працягам больш 2,0 клм па правым беразе ракі Заходняй Дзьвіны, захапляючы бічэўнік ракі паласою ад 20 да 50 м. Паміж кромкаю вады і ўзвышшамі берагу таўшчыня далёмітаў, якія набліжаюцца да ракі тэрасамі, зьмяняецца ад 1,0 да 3,0 м. Далей ад берагу ракі долёміты перакрыты сьвітай іншых парод агульнай таў-	1,27	абг. $^1/_1$ зар. 1, 2, 3	Распрацоўваюцца

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				шчынёю ад 5,0 да 10,0 м. У некаторых мясцох долёміты складаюць і дно ракі Заходняй Дзьвіны.			
7	340	Вапняк палеозойскі	в. Янкава	Вапняк у выглядзе паасобных плітак, уключаных у жоўты кварцавы пясок, знойдзен ля в. Янкавай на глыбіні 0,3 мэтра. Таўшчыня пласту і ўмовы знаходжаньня ня вызначаны.	16	—	н. р.
8	341	Валун крышталёвых пород	в. Бараўцы	Валуны крышталёвых пород раскіданы на палёх на значнай плошчы ня толькі ў ваколіцах вёскі Бараўцы, але таксама ў в. в. Курылавай, Максімавай і Кісьлякоў.	16	—	н. р.
9	342	Валун крышталёвых пород	в. Слабада і Лушчыха	Адзначаецца значная маса валуноў крышталёвых пород розная памеру да 1,5 м ў папярэчніку найбольш у рэчышчы ракі Заходняй Дзьвіны паміж вёскамі Слабадой і Лушчыхай.	27	—	н. р.
10	343	Валун крышталёвых пород	в. Гарбачова	Пашырэньне валуноў крышталёвых пород на палёх і ў ваколіцах вёскі Гарбачовай. Па даных сьведак згуртаваньне значнае, не праверана.	26	—	н. р.
11	344	Галечнік	в. Бялынавічы	Галечнік крышталёвых пород і вапнякоў у груба-зернавым пяску назіраецца па бакох шашы KW ад вёскі і непасрэдна ў в. Бялынавічы. Таўшчыня галечніку 2,0 м. Перакрыцьцё нязначнае.	26	3	н. р
12	345	Галечнік	в. Малы Двор	Галечнік крышталёвых пород знаходзіцца ў полі паміж Бешанковіцкім бальшаком і в. Малы Двор на захад ад мястэчка Астроўна на плошчы больш 5 га.	26	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
13	346	Галечнік	в. Камарова	Галечнік, часткай вяпнякоў, а ў большасьці крышталёвых пород, сустракаецца на палёх ля в. Камаровай, займаючы плошчу больш 10 га.	26	253	н. р.
14	347	Галечнік	в. Рамшын	Па палёх сустракаюцца паасобныя плошчы, багатыя на галечнік крышталёвых пород і вапнякоў, побач з сялібамі вёскі і далей па дарозе на в. Ляхаву.	26	—	—
15	348	Граві	в. Канаша	Граві крышталёвых пород сустракаецца па паверхні зямлі на плошчы да 2,0 га. Таўшчыня ня высьветлена.	16	—	Распрацоўваецца Дзяржбудам для будаўніцтва
16	349	Пясок	в. Камяжына	Пясок гравіевы вызначаецца ў падглебавым пластку альбо пад нязначнай перакрышай ля вёскі Камяжынай на значнай плошчы.	26	4	н. р.
17	60	Пясок	г. Віцебск	У ваколіцах гораду ў яры Гутараўшчына заўважана тоўшча пяску, маючых практычнае значэньне. Пяскі не дасьледваны.	42	—	—
18	350	Суглінак морэнавы	в. Дабрэйка	Морэнавы суглінак больш глініcты вышаў у абгаленьні на левым беразе ракі Заходняй Дзьвіны ля вёскі Дабрэйкі, дзе наглядаецца на працягу 250 мэтраў, маючы таўшчыню больш 6,0 мэтраў.	26	244	н. р.
19	351	Суглінак морэнавы	в. Асінаўка	Морэнавы суглінак амаль што цалкам складае бугрыну 15—18 мэтраў вышынёю, вузкую, маючую ў даўжыню некалькі кілёмэтраў, у напрамку NO — SW на паўночны ўсход ад в. Асінаўкі.	26	148	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
20	52	Суглінак морэнавы	в. Манастырская Слабада	Чырвона-буры морэнавы суглінак сустракаецца ля вёскі Манастырская Слабада. Дасьледваньне не праведзена.	42	—	н. р.
21	352	Гліна	в. Падакі	Досыць чыстая адмена морэнавага суглінку да 2,0 м таўшчыні знойдзена ў прамыінах і па бакох даліны ручая на N ад в. Падакі. Перакрыцьцё нязначнае.	26	265	н. р.
22	353	Гліна	в. Падакі	Непасрэдна ў в. Падакі і абгаленьні магчыма заўважыць істужкавыя гліны сталёвага і чакаляднага колеру да 2,5 м таўшчыні, з працягам па канавах больш 60 м.	26	266—267	н. р.
23	51	Гліна	г. Віцебск	У ваколіцах гораду па Сураскай шашы знаходзяцца адклады істужкавых глін да 2,0 м таўшчыні, займаючых значную плошчу пры перакрыцьці ў 2,0 м. іншымі пародамі.	26	1—2	Распрацоўваюцца ў буйным маштабе
				№ 19—10. Вульскі раён.			
1	276	Суглінак морэнавы	в. Пілі-паўка	На правым беразе ракі Заходняй Дзьвіны выяўлены ў абгаленьнях чырвона-буры морэнавы суглінак значнай таўшчыні ў ваколіцах в. Пілі-паўкі.	—	31	н. р.
2	275	Суглінак морэнавы	в. Вула	Чырвона-буры морэнавы суглінак знаходзіцца ў абгаленьнях левага берагу ракі Заходняй Дзьвіны ля в. Вулы.	19	—	н. р.
3	302	Гліна	в. Кардон	Плястычная чакаляднага колеру гліна да 5 0—6,0 м таўшчыні сустракаецца ў ваколіцах в. Кардон.	—	№ 376	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
4	303	Буры жалязьняк	в. Асінаўка	Згуртаваньні бурага жалезьняку выяўлены на плошчы, занятай нізінай паміж вёскамі Асінаўка, Кісялі, Карпіна, Будзішча, Піскуны і Альшанка. Сустракаецца тут буры жалязьняк пад расьлінным пластком на палёх і сенажаці паасобнымі згуртаваньнямі.	34	№ 29	н. р.
				№ 20—9. Вушацкі раён.			
1	268	Сугл нак морэнавы	в. Лазоўка	Чырвона-буры морэнавы суглінак з нязначнай колькасьцю валуноў і галькі розных парод, больш плястычны знойдзены ў ваколіцах в. Лазоўкі.	—	№ 28	н. р.
2	271	Крыніцы мінэралізаваныя	в. Баркаўшчына	Сярчана-жалезістыя крыніцы знаходзяцца на пляцоўцы ва ўзвышэньні ў некалькі мэтраў на беразе Баркаўшчызьненскага возера. Артэзіянскі струмень уздымаецца на 1,6—1,8 мэтра вышэй паверхні вады ў возеры.	19	—	н. р.
3	273	Валун вапняковы	м. Вушач	Крыху большае згуртаваньне вапняковых валуноў выяўлена ў ваколіцы мяст. Вушач.	19	—	н. р.
4	274	Валун вапняковы	в. Жары	Больш значнае згуртаваньне вапняковых валунаў і галькі заўважана ў ваколіцы в. Жары.	19	—	—
5	304	Маргель лугавы	в. Малы Далец	Маргель лугавы жоўта-белага колеру, мучністы, мяккі, багаты на вапну, таўшчынёю ад 0,3 да 1,0 м залягае на 10 паасобных бугрынах плошчаю ў кожным выпадку 40 на 60 м.	25	—	н. р.

№№ па паралку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 21—15. Высачанскі раён.			
1	354	Пясок	в. Ваўчок	Па левым беразе даліны ручаю ў абгаленьні знаходзяцца груба-зярнёвыя шэрыя пяскі таўшчынёю да 3,0 м, якія ў ніжняй частцы пераходзяць у граві да 1,0 м; зьверху перакрыты чырвона-бурым морэнавым суглінкам у 4 мэтры таўшчыні.	26	№ 167—169	н. р.
2	355	Пясок	в. Выдвінка	Шэры груба-зярнёвы пясок таўшчынёю больш 2,0 м залягае непасрэдна пад глебаю ў 0,5 кілёмэтра ад в. Выдвінкі.	26	№ 184—185	н. р.
3	356	Пясок	м. Бабінавічы	Пры ўтоку рэчкі Бабінаўкі ў возера Бабінаўскае знаходзяцца адклады сярэдня-зярнёвых сьветла-жоўтых пяскоў да 15 м таўшчынёю, якія залягаюць непасрэдна пад глебаю. Плошча значная.	26	№ 195	н. р.
4	56	Гліна	м. Бабінавічы	Плястычная чакаляднага колеру гліна знаходзіцца ў шматлікіх ямах па левым беразе рэчкі Чарніцы паміж мастом і вёскай Глушкавай, дзе абгаляецца да 1,0 м таўшчыні. Перакрыта да 1,5 мэтра пластом груба-зярнёвага пяску.	26	—	Распрацоўваецца мясцовымі ганчарамі на выраб пасуды
5	357	Галечнік	в. Асінаўка	Узвышша озавага тыпу ў 50 мэтрах на О ад бальшаку паміж в. Васкоўкай і Асінаўкай у размыве дае абгаленьне галечніку да 4 м таўшчыні, складзенага з крышталёвых пород, і на 45—50% з вапнякоў і долёмітаў. Шырыня озу нязначная, вышыня 10-11 м, даўжыня да 300 м.	26	№ 170—171	н. р.

№№ па паралку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
6	358	Галечнік	в. Бабінка	На палёх у ваколіцы в. Бабінкі знаходзіцца значная колькасьць галькі крышталёвых пород і пракідаюцца паасобныя буйныя валуны. У сярэдням з аднага ара можна сабраць да 1,0 куб. м галькі.	26	—	н. р.
7	360	Суглінак морэнавы	в. Брадкі	У ямах супроць вёскі Брадкі ля дарогі знаходзіцца тыповы моренавы суглінак, які абгаляецца на 1,5 м таўшчыні.	26	№ 183	н. р.
				№ 22—6. Гарадоцкі раён.			
1	360	Валун крышталёвых пород	в. Антоненкі	Валуны крышталёвых пород раскіданы на палёх у значнай колькасьці. Па межах паміж паасобнымі палосамі складзены валы з каменьняў.	16	—	н. р.
2	361	Валун крышталёвых пород	в. Загусьсе	Валуны крышталёвых пород раскіданы па палёх у ваколіцы в. Загусьсе.	16	—	н. р.
3	362	Валун вапняковы	в. Ярыгіна	Вапняковыя валуны і галька ўключаны ў моцныя груба-зярнёвыя пяскі да 6 мэтраў таўшчыні; заўважаны на плошчы больш 5 га.	42	—	Распрацоўка вапнякоў на ўгнаеньне глебы
4	363	Галечнік	в. Будніцы	Паасобныя ўзвышшы ўключаюць з паверхні на глыбіню 1,0 м вапняковую гальку ў гравіевых пяскох на плошчы да 1,5 га.	16	—	н. р.
5	364	Граві	в. Паўлючкі	Граві залягае з паверхні таўшчынёю да 4,0 м, у некаторых мясцох перакрыты чырвона-бурым морэнавым суглінкам да 1,5 м таўшчыні.	16	абг. № 16 уз. № 1	н. р.
6	365	Граві.	в. Выраўля	Граві крышталёвых пород з рэдкай вапняковай галькай залягае пластом да 2,0 м з паверхні зямлі па беразе ракі і непасрэдна ля в. Выраўлі.	16	абг. № 9 уз. № 1	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
7	366	Пясок	в. Зязюліна	Пясок іржава-буры буйназярнёвы залягае з паверхні пластом да 1,5 м таўшчыні на плошчы 1,5—2,0 га.	16	абг. № 14 уз. № 1	н. р.
				№ 23—76. Глускі раён.			
1	5	Валун вапняковы	в. Сымановічы	На левым беразе ракі Пічы ля маста праз раку на шашы ў ваколіцах паштовай станцыі Сымановічы ва ўрочышчы Кій назіраюцца згуртаваньні вапняковых валуноў.	36	—	н. р.
2	7	Буры жалязьняк	в. Сымановічы	На правым беразе ракі Пічы на N ад паштовай станцыі Сымановічы выяўлены адклады бурых жалезьнякоў, якія маюць значную колькасьць фосфарнага ангідрыду.	39	—	н. р.
3	10	Буры жалязьняк	в. Жоўвінец	Адклады бурага жалезьняку знойдзены паміж в.в. Жоўвінец і Істэркі на балоце ля дарогі.	39	—	н. р.
				№ 24—89. Гомельскі раён.			
				№ 25—36. Горацкі раён.			
				№ 26—63. Грэскі раён.			
1	283	Суглінак морэнавы	м. Грэск	Морэнавы суглінак чырвона-бурага колеру знаходзіцца ў абгаленьнях ля м. Грэск. Адклады не дасьледваны.	42	—	Сялянскія распрацоўкі
2	279	Крэйда	в. Буда-Грэская	Адклады крэйды выяўлены ў адлегласьці 1,0 кілёмэтра на N ад в. Буда-Грэская. Таўшчыня крэйды больш за 7,2 м (ня пройдзена). Перакрыша да 1,0 мэтра.	39	—	Сялянская распрацоўка ямамі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 27—37. Дрыбінскі раён.			
1	506	Крэйда	в. Паласкі	Распрацоўваецца Паляводсаюзам БССР. Абгаленьне крэйды не дасьледвана. Умовы знаходжаньня ня высьветлены.	42	—	Распрацоўваецца
				№ 28—1. Дрысенскі раён.			
1	306	Долёміты	в. Калюты	Пласты долёмітаў пэтрографічна падобныя да долёмітаў, знойдзеных на берагох Заходняй Дзьвіны вышэй Віцебску, але ня даўшых палеантолёгічнага матар'ялу, былі прасочаны дасьледчыкам на працягу 2,5 клм ад в. Фальваркавай вышэй па рэчцы да в. Калюты. Галоўнае абгаленьне долёмітавае сьвіты на правым беразе рэчкі Сар'янкі даўжынёю да 170 м знаходзіцца ў адлегласьці 2 клм ад в. Калюты ўніз па цячэньні ракі. Таўшчыня долёмітаў вышэй ўзроўню воды ў рацэ ад 2,23 да 3,24 мэтра. Найбольш важнае абгаленьне долёмітаў на Полаччыне. Дасьледчык вызначае запас долёмітаў больш як у 50 млн. клг толькі ў адкладах тэрасы ля абгаленьня, а калі прыняць пад увагу ўсю тэрасу паміж в. Калюты і в. Фальваркавай, то гэта ў значнай ступені павялічыць колькасьць долёмітаў. Згодна з хэмічнымі аналізамі, зробленымі Хэмічным Інстытутам БАН, долёміты рэчкі Сар'янкі маюць ад 45,34% да 47,59% $CaCO_3$ і да 41,01% да 42,01% $MgCO_3$.	25	—	Распрацоўваецца

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	305	Долёміты	в. Сакалоўка	Абгаленьне тых самых долёмітаў, што і ў вёсцы Калюты, толькі ўжо на левым беразе ракі Сар'янкі ля в. Сакалоўкі.	25	—	н. р.
3	307	Гліна	в. Анісьеўка	Раней вызначаную тоўшчу долёмітаў падсьцілае сіняя плястычная гліна дэвонскага ўзросту якая выходзіць у абгаленьні правага берагу р. Сар'янкі ля в. Анісьеўкі. Тоўшча гліны не дасьледвана.	25	—	н. р.
4	308	Торф старадаўні	в. Дворжыца	Старадаўні торф знойдзены пад перакрышай пяскоў і суглінкаў у 5,0 м агульнай таўшчыні на левым беразе р. Сар'янкі ля в. Дворжыцы ў моцным абгаленьні. Торф гэты мае розную таўшчыню ад 0,5 да 3,0 м і хутка зусім зьнішчаецца, утвараючы пасобныя лінзы.	33	№ 564	н. р.
				№ 29—28. Дубровенскі раён.			
1	267	Валун вапняковы	в. Сланы	Валуны і галька вапнякоў і долёмітаў заўважаны ў невялікай колькасьці ў берагавых абгаленьнях і па берагох ракі Дняпро ля в. Сланы.	14	—	н. р.
2	266	Валун вапняковы	в. Новая Тухінь	Некаторая колькасьць вапняковых валуноў і галькі заўважана ў адкладах левага берагу р. Дняпро ля в. Новая Тухінь. Концэнтрацыя валуноў слабая.	14	—	н. р.
3	265	Валун вапняковы	м. Дуброўна	Вапняковыя і долёмітавыя валуны і галька сустракаюцца ў адкладах левага берагу р. Дняпро ля м. Дуброўны. Умовы знаходжаньня ня выяўлены.	14	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
4	242	Гліна	в. Новая Тухінь	Гліна чакаляднага колеру не карбонатная таўшчынёю да 2,0 м знойдзена ў абгаленьні левага берагу р. Дняпро супроць в. Новая Тухінь.	14	—	н. р.
5	241	Гліна	в. Халеўе	Гліна-зеленавата-шэрага і зелевата-бурага колеру плястычная таўшчынёю больш 2 м выяўлена ў абгаленьні левага берагу ракі Дняпро ў ваколіцах в. Халеўе. Гліна не вывучалася.	14	№ 23	н. р.
6	239	Гліна	м. Дуброўна	Гліна сьветла-жоўтага колеру знаходзіцца ў абгаленьні левага берагу р. Дняпро на 2 клм ніжэй м. Дуброўны. Гліна не вывучалася.	14	№ 13	н. р.
7	240	Гліна	м. Дуброўна	Гліна попельнага колеру таўшчынёю да 2 м знойдзена ў абгаленьні правага берагу р. Дняпро. Абгаленьне не дасьледвана.	14	№ 15	н. р.
				№ 30—78. Жлобінскі раён.			
1	436	Маргель салодкаводны	в. Зароўская	На W ад в. Зароўскай сярод тарфянога балота знойдзены салодкаводны маргель, які залягае пад пластом торфу ў 0,8 м таўшчыні і сам мае таўшчыню ад 0,4 да 0,5 м. Маргелю падлягае шэры вадатрымаючы пясок.	16	№ 25—31	н. р.
2	11	Пясок	м. Стрэшын	Белы кварцавы пясок, бедны на тленьнікі жалеза, знаходзіцца ў правым высокім беразе р. Дняпро. Пясок гэты мае таўшчыню больш 2,0 м і вышаў уздоўж берагу на адлегласьці да 250 м.	39	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	9	Буры жалязьняк	м. Стрэшын	Два пласткі бурага жалезьняку, падпарадкаваных, на думку дасьледчыка, карэнным адкладам, агульнай таўшчынёю ў 0,35 м знаходзяцца на N ад м. Стрэшын у адлегласьці 1,0—1,5 клм.	39	—	н. р.
4	437	Буры жалязьняк	м. Стрэшын	У 3-х клм на S ад м. Стрэшын ва ўрочышчы Масты буры жалязьняк знойдзен у раўчаку, зробленым праз балота ад берагу р. Дняпро да в. в. Жырхаўкі і Мікуліч. Буры жалязьняк зямлісты, зьмешаны з торфам найбольшай таўшчыні да 0,3 м, часта сустракаецца паасобнымі згуртаваньнямі. Падсьцілае яго шэры пясок.	16	№ 3—5	н. р.
5	438	Буры жалязьняк	м. Стрэшын	Буры жалязьняк знойдзены на адлегласьці ў 0,5 клм на SO ад м. Стрэшын уніз па цячэньні р. Дняпро на правым беразе ва ўрочышчы Пяскоўскае Балоньне. Назіраецца руда на працягу да 30 м уключанай у гліну шэрага колеру.	16	№ 1—2 6—7	н. р.
6	439	Буры жалязьняк	м. Стрэшын	На О ад м. Стрэшын каля парому, перайшоўшы нявялікую пратоку р. Дняпро, заўважана прысутнасьць бурых жалезьнякоў да 0,4 м найбольшай таўшчыні, на працягу ўздоўж берагу да 40,0 м.	16	—	н. р.
7	440	Буры жалязьняк	м. Стрэшын	Буры жалязьняк знаходзіцца на выгане на поўнач ад м. Стрэшын паасобнымі згуртаваньнямі да 0,35 м найбольшай таўшчыні.	16	—	н. р.
8	30	Гліна	в. Малявічы	Гліна знойдзена ў абгаленьні пры разьезьдзе №22 Заходніх чыгунак ля в. Малявічы.	39	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
9	31	Гліна	в. Праскурня	Адклады гліны пашыраны ў ваколіцах в. Праскурні; да апошняга часу не дасьледваны.	39	—	н. р.
10	16	Гліна	м. Стрэшын	Гліна знойдзена на ўзвышшы правага берагу р. Дняпро на поўнач ад мястэчка ў некалькіх мясцох. Гліна гэта не дасьледвана.	39	—	Сялянская распрацоўка ямамі
11	28	Суглінак морэнавы	м. Жлобін	На ўзвышшах правага берагу р. Дняпро мае значнае пашырэньне чырвона-буры морэнавы суглінак, найбольш на N ад м. Жлобін.	39	—	Распрацоўваецца
12	32	Суглінак морэнавы	в. Затон.	Чырвона-буры пяшчаністы морэнавы суглінак знаходзіцца па ўзвышшах правага берагу р. Дняпро на значнай плошчы.	39	—	н. р.
13	29	Суглінак морэнавы	в. Шыхава	На поўдзень ад в. Шыхавай на ўзвышшах правага берагу р. Дняпро залягае на значнай плошчы звычайнага тыпу морэнавы суглінак.	39	—	н. р.
14	15	Суглінак морэнавы	в. Замосьце	Суглінак не дасьледваны.	42	—	—
				№ 31—68. Журавіцкі раён.			
1	411	Крэйда	в. Шапчыцы	Адклады крэйды займаюць ніжэйшы гіпсомэтрычны ўзровень; яны выйшлі тут на паверхню зямлі на ўзроўні цячэньня ракі. Уздоўж берагу крэйда цягнецца да 50,0 м. Таўшчыня невядома. Перакрыта на беразе пяскамі і суглінкамі чацьвярцёвага пэрыоду значнае таўшчыні.	35	—	Набываецца сялянамі
				№ 32—81. Жыткавіцкі раён.			
1	488	Буры жалязьняк	в. Пасталы	На NW ад в. Пасталы ёсьць паклады бурага жалезьняку паасобнымі згуртаваньнямі на плошчы да 3-4 га.	28	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А.	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 33—38. Заслаўскі раён.			
1	181	Морэнавы суглінак	в. Бінькаўцы	Морэнавы суглінак больш гліністы з нязначнай колькасьцю галькі і валуноў крышталёвых пород знаходзіцца ў ваколіцах в. Бінькаўцы.	42	—	Сялянскія распрацоўкі
				№ 34—99. Камарынскі раён.			
				№ 35—83. Капаткевіцкі раён.			
				№ 36—62. Капыльскі раён.			
1	284	Буры жалязьняк	м. Пясочна	У цойме даліны р. Нёмну заўважаны згуртаваньні бурага жалезьняку ля мястэчка Пясочна.	42	—	н. р.
				№ 37—93. Каралінскі раён.			
				№ 38—69. Кармянскі раён.			
1	194	Крэйда	в. Глінка	Крэйда выйшла на некаторай працяжнасьці ў абгаленьні правага берагу р. Сажа на некалькі мэтраў вышэй паверхні вады ў рацэ і перакрыта рознымі пяскамі.	6	№ 59	н. р.
2	195	Крэйда	в. Казіміраў	Абгаленьне крэйды наглядаецца ў тым месцы, дзе ўзвышша набліжаецца да ракі і апошняя падмывае яго. Абгаленьне не дасьледвана.	6	—	н. р.
3	196	Крэйда	в. Казіміраў	Абгаленьне крэйды ў падмыве правага берагу ракі ніжэй в. Казімірава. Не дасьледвана.	6	—	н. р.
4	197	Крэйда	в. Касьцюкоўка	Правы бераг ракі Сажа складзены крэйдай, перакрытай пухкімі адкладамі, у большасьці рознымі пяскамі, і перарэзаны некалькімі равамі, дае абгаленьні, дзе ўзвышша падмываецца ракою.	6	№ 61	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
5	198	Крэйда	в. Студзянец	Абгаленьне крэйды знаходзіцца на правым беразе ракі ля в. Студзянец. Крэйда складае ніжнюю частку ўзвышша і займае бічэўнік ракі.	6	№ 65	н. р.
6	412	Крэйда	в. Кароцькі	Знойдзена крэйда ля вёскі Кароцькі; пакуль што не дасьледвана.	—	—	Распрацоўваецца
7	208	Гліна	в. Глінка	Зялёна-шэрая гляўконітавая гліна таўшчынёю да 1,0 м знаходзіцца ў абгаленьні правага берагу р. Сажа і ля дарогі на м. Карму.	6	№ 60	Нязначныя сялянскія распрацоўкі ямамі
8	209	Гліна	в. Студзянец	Вызначана зеленавата-шэрая гляўконітавая гліна на правым беразе р. Сажа, ніжэй сяліб.	6	№ 67	н. р.
9	221	Буры жалязьняк	в. Казіміраў	Крыху ніжэй в. Казіміраў у пойме правага берагу р. Сажа залягае буры жалязьняк паасобнымі згуртаваньнямі.	6	№ 43	н. р.
10	222	Буры жалязьняк	Прыстань Карма на р. Сажы	Буры жалязьняк знаходзіцца на паверхні і на нязначнай глыбіні па абодвух берагох р. Сажа на значнай плошчы паасобнымі згуртаваньнямі. Таксама была выяўлена прысутнасьць яго наогул па западзінах і лагчынах у гэтай мясцовасьці, напрыклад, ля в. Вынашаўкі, паселішча Чырвоны Бор, вурочышча Ялаўка і г. д. Па даных хэмічных аналізаў, зробленых у лябораторыі тэхнічнае хэміі БДУ, бурыя жалезьнякі Кармянскага раёну маюць 5,42%—5,44% P_2O_5; 3,79%—4,42% FeO і 46,60%—40,12% Fe_2O_3 (хэм. ан. № 26 і 27).	6	№ 1—6	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
11	215	Крэмень	в. Касьцюкоўка	На палёх і ў рачной гальцы знаходзяцца сьцяжэньні чорнага крэменю, адмытыя ракою з крэйдавых адкладаў.	6	—	н. р.
12	216	Крэмень	в. Студзянец	На палёх і ў рачной гальцы сустракаюцца паасобныя сьцяжэньні чорнага крэменю, пакрытыя сьветла-шэраю абалонкаю, вымытыя ракою з крэйдавых адкладаў.	6	—	н. р.
				№ 39—71. Касьцюковіцкі раён.			
1	166	Маргель	в. Гумніцкая	Крэйдавы маргель знойдзены ля в. Гумніцкая на левым беразе ракі Рассохаўкі.	8	—	н. р.
2	164	Маргель	м. Касьцюковічы	Абгаленьне крэйдавага маргелю заўважана на левым беразе р. Жадункі ля сяліб мястэчка.	8	—	н. р.
3	165	Маргель	м. Касьцюков чы	Побач з пасёлкам крэйдавы маргель выходзіць на паверхню ў абгаленьнях правага берагу рэчкі Жадункі.	8	—	н. р.
4	413	Маргель	в. Канічы	Знойдзены адклады крэйдавага маргелю ў абгаленьнях берагоў ракі Сурава.	8	—	Распрацоўваецца
5	162	Маргель	в. Хоцімск (ніжні)	Ля вёскі Хоцімск (ніжні) у абгаленьні правага берагу ракі Бесядзі знойдзены адклады крэйдавага маргелю.	8	—	н. р.
6	163	Маргель	в. Хоцімск (ніжні)	Ля в. Хоцімск (ніжні) у абгаленьні левага берагу р. Бесядзі знойдзены адклады крэйдавага маргелю. Адклады не вывучаліся.	8	—	н. р.
7	148	Пясок	в. Вітунь	Белыя тэхнічныя кварцавыя пяскі вышлі на паверхню ў падмыве сьценак рава на правым беразе р. Бесядзі ніжэй в. Вітунь. Назіраная таўшчыня пяскоў да 1,5 м. Працяжнасьць да 150—200 м уздоўж рава.	8	№ 264	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
8	149	Пясок	в. Канічы	Узвышша правага берагу ракі Бесядзі мае паўцыркульную форму, адзін з рагоў якой падыходзіць да даліны ракі ля в. Канічы; гэтае ўзвышша тут з аднаго боку падмываецца ракою, а з другога перарэзана глыбокім раўчаком. На гэтых двух бакох абгаляецца сьвіта пяскоў значнае таўшчыні на працяжнасьці 130 м уздоўж берагу ракі. Ня гледзячы на перакрышу другіх парод у некалькі м, трэба адзначыць, што абгаленьне, у якім уключана значная тоўшча шэрых тэхнічных кварцавых пяскоў, знаходзіцца ў спрыяючых умовах і зьяўляецца эканомічна важным. Магчыма мэханізацыя здабычы пяскоў у буйным маштабе.	8	№ 266-267	н. р.
9	150	Пясок	м. Бялынкавічы	Пры заваразе ракі Бесядзі на 400 м вышэй маста чыгункі Ворша—Унеча ў абгаленьні правага берагу ракі вышла моцная да 10,8 м таўшчыні сьвіта пяскоў працяжнасьцю ўздоўж берагу на 120 м. Пяскі істужкавыя, розна афарбаваныя; ёсьць і белыя кварцавыя.	8	№ 269-277	н. р.
10	151	Пясок	в. Кубракаўка	Абгаленьне белага кварцавага пяску знаходзіцца на правым беразе ракі Бесядзі ля в. Кубракаўкі. Адклады пяску не дасьледваны.	8	№ 13	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
11	152	Пясок	в. Белая Дубрава	Пясок кварцавы белы знойдзены ў абгаленьні правага берагу р. Бесядзі ля вёскі Белая Дубрава.	8	№ 15	н. р.
12	154	Пясок	в. Клюевічы	Белы кварцавы пясок заўважаны ў абгаленьні правага берагу р. Бесядзі ля в. Клюевічы.	8	№ 18	н. р.
13	143	Гліна	м. Касьцюковічы	Гліна рознага колеру знойдзена ў абгаленьні 0,5 клм адлегласьці ад м. Касьцюковічы на дарозе ў вёску Гумніцкую.	8	№ 53	н. р.
14	142	Гліна	в. Ліпаўка	Выяўлена наяўнасьць цёмна-шэрае гліны ў абгаленьні левага берагу р. Жадунькі ля в. Ліпаўкі.	8	№ 49	н. р.
15	138	Гліна	в. Белая Дубрава	Гліна чырвона-бурага колеру, пескаватая выкрыта ў абгаленьні левага берагу ракі Дзяражны ля ўтоку яе ў раку Бесядзь.	8	№ 16	н. р.
16	139	Гліна	в. Прудок	Гліна чакаляднага колеру знаходзіцца ў абгаленьні правага берагу р. Бесядзі ля дарогі на вёску Слабодку.	8	№ 19	н. р.
17	140	Гліна	в. Слабодка	Гліна чакаляднага колеру выходзіць на паверхню непасрэдна за сялібамі ў абгаленьнях увалаў правага берагу р. Бесядзі.	8	№ 31	н. р.
18	141	Гліна	в. Вялікі Бор	З распрацовак сялян ля дарогі з в. Вялікі Бор на саўгас Папкі ў 1,5—2 клм ад ракі Бесядзі ўзяты ўзоры чорнае гліны.	8	№ 37	Нязначн. сялянскія распрацоўкі ямамі
19	129	Фасфарыты	в. Канічы	Фасфарытавыя конкрэцыі заўважаны ў галечніках, вышаўшых у падмывах берагоў рэчкі Сурава ў пэўнай адлегласьці ад існуючай грэблі для млыну. Згуртаваньне фасфарытаў і характар адкладаў не вывучаліся.	8	№ 268	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
20	112	Буры жалязьняк	в. Кубракаўка	Паасобныя згуртаваньні бурага жалезьняку знаходзяцца на правым беразе р. Бесядзі і ў яе старым вадатоку побач з в. Кубракаўкаю.	8	№ 27	н. р.
				№ 40—61 Клімавіцкі раён.			
1	104	Крэйда	в. Іванаўшчына	Вышэй в. Іванаўшчыны на 0,5 клм ад правага берагу р. Сажа ва ўрочышчы Крэйдавая гара знаходзіцца моцнае абгаленьне адкладаў крэйды, падзеленае глыбокім раўчаком на 2 часткі. Крэйда залягае на 9-10 м вышэй роўню паверхні вады ў рацэ Астра, і абгаленьне цягнецца ўздоўж ракі больш як на 100 мэтраў. Перакрыша іншымі пародамі ў бліжэйшай да берагу частці нязначная, далей ад берагу павялічваецца. Абгаленьне ўключае значныя запасы крэйды добрае якасьці. Згодна з хэмічнымі аналізамі, зробленымі Хэмічным Інстытутам БАН, гэтая крэйда мае ад 93,16% да 96,43% $CaCo_3$ пры нерастворнай астачы толькі ад 0,54% да 1,28% (хэм. анал. № 129, 131 і 134).	9	№ 594—670	н. р.
2	105	Крэйда	в. Іванаўшчына	Адклады крэйды выходзяць на паверхню ў абгаленьні левага берагу ракі Астра непасрэдна ў вёсцы ў некалькіх мясцох.	9	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	103	Крэйда	в. Стары Дзедзін	Крэйда знаходзіцца ў абгаленьні правага берагу ракі Астра ля вадзянога млыну, дзе яна ўздымаецца на 2,5 м вышэй паверхні вады ў загачанай частцы ракі; працяжнасьць абгаленьня ўздоўж ракі каля 25,0 м. Крэйда вышла таксама далей па змытаму берагу ракі, на якім зроблена сялянамі шмат крэйдавых ям. Абгаленьне знаходзіцца часткай пад будынкамі, часткай занята гародамі, і ў крэйду ўпіраецца адным бокам гаць, дзеля чаго для распрацоўкі крэйды самае абгаленьне малапрыдатнае.	9	№ 554-556	Нязначныя сялянскія распрацоўкі ямамі
4	93	Крэйда	в. Роськава	Крэйда вызначаецца на тэрасе, на якой знаходзіцца в. Роськава, і на зьніжаных частках берагу, а таксама на дарозе ў в. Новы Дзедзін. Плошча, на якой знойдзена крэйда, занята сялібамі.	9	№ 554-556	Нязначныя сялянскія распрацоўкі ямамі
5	92	Крэйда	в. Грышын	У абгаленьні берагу ракі Лабжанкі ля в. Грышын знаходзім адклады крэйды.	7	№ 137	н. р.
6	91	Крэйда	в. Поля	У вадазборы ракі Лабжанкі побач з вёскай Поля паасобнымі плямамі пракінулася крэйда.	7	№ 132	н. р.
7	82	Крэйда	г. Клімавічы	У адлегласьці 3-х клм ад г. Клімавічы на правым баку даліны рэчкі Лабжанкі ва ўрочышчы Крэйдавая Гара знаходзіцца значнае ўзвышша, на баку якога крэйда выходзіць на паверхню. Значная маса крэйды знаходзіцца ў гэтым узвышшы на 12 м вышэй узроўню вады ў рацэ пры перакрышы іншых парод таўшчынёю да 6 м і больш. Згодна з данымі хэмічнага аналізу, зробленага ў Хэмічным Інстытуце БАН, крэйда паверхнёвае часткі пласту мае 91,05% $CaCo_3$ (хэм. анал. № 70). Што да глыбей лежачай крэйды, то яна больш гліністая.	8	№ 165	Вядзецца распрацоўка абгаленьня
8	83	Крэйда	г. Клімавічы	Крэйда знаходзіцца па левым барту даліны рэчкі Калініцы пры выезьдзе з гораду на правы бок ад дарогі на в. Ціманаў. У распрацоўцы, якая вядзецца тут, крэйда бярэцца пластом да 4 м. Агульная таўшчыня крэйды невядома. Перакрыша 2-3 м—моцна пескаваты чырвона-буры морэнавы суглінак з валунамі і галькай крышталёвых парод.	8	№ 173	н. р.
9	84	Крэйда	г. Клімавічы	На ўзвышшы крэйда пракінулася ў гарадзкім гаі налева ад дарогі на вёску Рэўты за чыгункай у некалькіх мясцох.	8	№ 17	н. р.
10	85	Крэйда	г. Клімавічы	Пры выезьдзе з гораду на левы бок ад дарогі на в. Янаўку і на левы бок ад чыгункі ў напрамку на Унечу знаходзіцца абгаленьне крэйды на паверхні зямлі, нязначнае па сваіх памерах.	7	№ 2	н. р.
11	86	Крэйда	г. Клімавічы	На плошчы кар'еру 154 клм чыгункі Ворша-Унеча крэйда знойдзена пры распрацоўцы балясту. Верхняя паверхня яе на 4 м вышэй узроўню вады ў рацэ Лабжанцы.	7	№ 87	н. р.
12	87	Крэйда	г. Клімавічы	Адклады крэйды пракінуліся на ўзвышшы Хваевым побач з Крэйдавай Гарой на правым			

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				баку даліны рэчкі Лабжанкі мэтры на 3-4 вышэй поймы даліны.			
13	88	Крэйда	г. Клімавічы	Абгаленьне адкладаў крэйды знаходзіцца ў 4 клм ад гораду Клімавіч па дарозе на вёску Лазовіцу ў вадазборы рэчкі Выдрынкі, правае прытокі рэчкі Лабжанкі.	7	№ 92	н. р.
14	89	Крэйда	в. Гразівец	На дарозе з вёскі Гразівец на Клімавічы на схіле спадзістага ўзвышша на працяжнасьці 50 м і на сумежных палёх адзначаецца паасобнымі плошчамі крэйда. Не вывучалася.	8	№ 97	н. р.
15	90	Крэйда	в. Гразівец	Па дарозе з вёскі Гразівец на м. Крычаў на схіле ўзвышша пракінулася паасобнымі плямамі крэйда, займае адносна высокі гіпсомэтрычны ўзровень у параўнаньні з паверхняй вады ў рэчцы Лабжанцы. Не вывучалася.	8	№ 98	н. р.
16	95	Крэйда	в. Ігнатаўка	Абгаленьне крэйды знаходзіцца ў падмыве ракою Сажом узвышша левага берагу ля в. Ігнатаўкі. Крэйда ў абгаленьні ўздымаецца на 4 м вышэй узроўню паверхні вады ў рацэ і цягнецца ўздоўж ракі да 120 м. Зьверху крэйда перакрыта сьветлымі пяскамі ў некалькі м таўшчыні.	7	№ 149	н. р.
17	420	Крэйда	в. Прудок	Абгаленьне крэйды знаходзіцца на левым карэнным беразе ракі Астра, які паступова ўздымаецца над шырокаю поймаваю тэрасаю ў мясцовасьці пад назваю Прудок у ямах, адкуль крэйда здабывалася на пабудову гаці і другія патрэбы.	9	№ 578	Крэйда распрацоўвалася ў нязначных памерах

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
18	157	Маргель	в. Васькоўка	Крэйдавы маргель сустракаецца на паверхні зямлі ў адлегласьці 1,0 клм ад в. Васькоўкі на дарозе на в. Захады, а таксама на дарозе на в. Цярпілаўку.	8	№ 203	н. р.
19	414	Апока	в. Іванаўшчына	Ва ўрочышчы Крэйдавая Гара 0,5 клм вышэй па цячэньні ракі ад в. Іванаўшчыны адклады крэйды на левым беразе ракі Астра перакрыты апокай да 0,5—1,0 м таўшчыні. Па хэмічных аналізах, зробленых у Хэмічным Інстытуце БАН, гэтая апока мае да 78,86% SiO_2 пры нерастворнай астачы ў 84,66% (хэміч. анал. № 127).	9	—	н. р.
20	415	Апока	в. Іванаўшчына	Крэйда ў абгаленьні левага берагу ракі Астра непасрэдна ў вёсцы Іванаўшчына перакрыта апокай да 0,5 м таўшчыні.	9	—	н. р.
21	416	Апока	в. Роськава	Апока перакрывае адклады крэйды зьверху пластом да 0,5 м таўшчыні на правым беразе ракі Астра. Назіраецца добра па абгаленьнях і ямах.	9	—	н. р.
22	122	Фасфарыты	в. Каралішкі	Узвышша правага берагу ракі Астра супроць в. Каралішкі ва ўрочышчы Сеяная Гара ўключае прапластаваньне галечніку, трымаючага конкрэцыі шэрага пескаватага фасфарыту, зьмешанага з галькай крышталёвых парод. Домесь бурага слаба-гліністага сьлізкага на вобмацак пяску надае характэрную індывідуальнасьць гэтым адкладам. Згодна з хэмічным аналізам, зробленым	9	№ 559-577	Галечнік распрацоўваўся раней з будаўнічымі мэтамі, дзеля чаго і назва Сеяная Гара

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А.	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				Хэмічным Інстытутам БАН, фасфарытавыя конкрэцыі маюць 17,45% P_2O_5 пры 37,9% нерастворнае астачы.			
23	125	Фасфарыты	в. Клімавічы кар'ер 154 кілёмэтра чыгункі Ворша-Унеча	Вывучэньне вадазбору ракі Лабжанкі дало мне магчымасьць выявіць наяўнасьць значных згуртаваньняў фасфарытавых конкрэцый глінiстага тыпу чацьвярцёвага пэрыоду пад чырвона-бурым моренавым суглінкам у кар'еры 154 клм чыгункі Ворша-Унеча, маючых спэцыфічныя ўмовы залягання, адзначаныя на складзеных мной профілях. Згуртаваньне гэтае выяўлена дэталёва. Фасфарытавыя конкрэцыі паасобнага вызначанага мной тыпу зьяўляюцца больш багатымі на P_2O_5, якое дасягае 20% і крыху больш. Асаблівасьці гэтых фасфарытаў яшчэ вывучаюцца мной у сучасны момант.	8	№ 146-163	Праводзіцца распрацоўка згуртаваньняў
24	126	Фасфарыты	г. Клімавічы	Згуртаваньне фасфарытавых конкрэцый знаходзіцца на правым беразе р. Лабжанкі ў гарадзкім хвойніку. Выяўленая частка згуртаваньня перакрыта пяскамі на нязначную таўшчыню, часткай выходзіць на паверхню. Падрабязнае дасьледваньне з г у р т а в а н ь н я зроблена ВСНГБ.	8	№ 197-198	Распрацоўваецца ў сучасны момант
25	128	Фасфарыты	г. Клімавічы	Паміж распрацоўкай чырвона-бурага морэнавага суглінку для вырабу цэглы і Крэйдавай Гарой на правым беразе даліны ракі Лабжанкі ў засечцы, зробленай на схіле ўзвышша, выяўлена мной на-	7	№ 179	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				яўнасьць таго самага пластку фасфарытавых конкрэцый, што і ў кар'еры чыгункі ля гораду Клімавічы.			
26	127	Фасфарыты	в. Гразівец	Па ўвалах і на палёх правага берагу ракі Лабжанкі ля вёскі Гразівец знаходзіцца ў раскіданым стане галька пескаватых фасфарытаў. Галечнік, які трымае гэтыя конкрэцыі фасфарытаў, знаходзіцца і тут на тым-жа гіпсомэтрычным узроўні, як і ў Клімавічах.	8	№ 64	н. р.
27	145	Пясок	г. Клімавічы	У а д л е г л а с ь ц і 3 клм ад гораду Клімавіч на дарозе на в. Лазовіцы ва ўрочышчы Выдрынка і па даліне рэчкі Выдрынкі выяўлены паклады сьнежна-белых дробна-зярнёвых вельмі чыстых кварцавых пяскоў па зондыроўках больш 2 м т а ў ш ч ы н і пры нязначнай перакрышы іншымі пародамі	6	№ 28	н. р.
28	109	Буры жалязьняк	в. Роськава	У невялікай колькасьці буры жалязьняк выяўлены ў абгаленьнях правага і левага берагоў ракі Астра, амаль што на палове дарогі паміж в. в. Роськавай і Старым Дзедзіным.	8	№ 557	н. р.
29	110	Буры жалязьняк	в. Новы Дзедзін	Буры жалязьняк знаходзіцца паасобнымі згуртаваньнямі на пойме правага берагу ракі Астра супроць вёскі Новы Дзедзін.	9	—	н. р.
30	134	Гліна	в. Іванаўшчына	Сьвідраванымі прабоінамі, зробленымі мной на схіле ўзвышша левага берагу ракі Астра, ва ўрочышчы Крэйдавая Гара выяўлена, што крэй-	9	Сьв. пр. № 1-2	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				да перакрываецца зеленавататашэрай гляўконітавай глінай 0,2 м таўшчыні; перакрыша другіх парод нязначная, але далей ад берагу ракі павялічваецца.			
31	136	Суглінак	в. Хадунь	Сьвіта розных суглінкаў знаходзіцца ў абгаленьні левага берагу ракі Астра ля вёскі і ніжэй па цячэньні ракі да раней існаваўшага млыну. Шэры морэнавы суглінак мае таўшчыню да 5 м вышэй роўню паверхні вады ў рацэ.	9	№ 549-551	н. р.
32	526	Іскрак	г. Клімавічы	Сьвідраванаю п р а б о і н а ю № 11 на глыбіні 25,0—26,0 м у адкладах пескаватае крэйды выяўлены прапластак, маючы, згодна з данымі хэмічнага аналізу 6,62%. Неадкладна правесьці далейшае дасьледваньне.	8,9	№ 72	н. р.
				№ 41—55, № 56. Клічаўскі раён.			
1	441	Гліна	в. Бацэвічы	На S ад саўгасу Бацэвічы ў адлегласьці 1,0 клм на ўзвышшы пад пластом пяску да 1,0 м таўшчыні залягае істужкавая гліна 2,5—3,0 м таўшчынёю на плошчы 4,0—5,0 га.	11	№ 13	Працуе цагельня
2	442	Суглінак морэнавы	в. Стаялаў	На плошчы ў 3-4 га перакрыты ад 0,5 да 1,0 м пяском у адлегласьці 1,0 клм на N ад вёскі Стаялава вышаў чырвона-буры морэнавы суглінак.	11	№ 16	н. р.
3	443	Суглінак морэнавы	в. Іванаўская	Чырвона-буры пескаваты морэнавы суглінак, перакрыты пяском да 1,0 м, залягае на плошчы 2,0 га.	11	№ 15	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
4	444	Суглінак морэнавы	в. Нясята	Чырвона-буры пескаваты морэнавы суглінак залягае на плошчы 3-4 га ў адлегласьці 1,0 клм на S ад саўгасу Нясята. Таўшчыня ня вывучана.	11	№ 28	н. р.
				№ 42—41. Койданаўскі раён.			
1	173	Валун вапняковы	в. Паусье	Валуны палеозойскіх вапнякоў сустракаюцца ў значнай колькасьці ў в а к о л і ц а х в. Паусье.	19, 36	—	—
2	172	Крэйда	в. Лісаўшчына (ст. Фаніпаль)	Адклады крэйды знаходзяцца на паўночны ўсход ад в. Лісаўшчыны ў адлегласьці 0,8 клм на плошчы да 2,0 га на глыбіні ад 0,6—2,6 м. Крэйда мае таўшчыню да 5,75 м. Запасы ня вызначаны.	38	№ 1	Распрацоўваліся насельніцтвам для сваіх патрэб
3	170	Крэйда	м. Койданава, саўгас Дзягільна	Адклады крэйды знаходзяцца па Рубяжанскім гасьцінцы на вадападзеле паміж двох ручаёў, якія з W і O акружаюць вёску Дзягільню і ўпадаюць у раку Пературу (вадазбор ракі Нёмна). Дасьледчыкам заўважаны тры пасобныя месцы, дзе вызначана крэйда. Першыя адклады крэйды знаходзяцца ў 0,6 клм на NW ад паўночнага боку в. Дзягільні зьлева ад Рубяжанскага гасьцінцу (усходні паклад).	38	№ 2	Распрацоўваецца
4	400	Крэйда	м. Койданава, саўгас Дзягільна	Другі, значна большы паклад крэйды (заходні паклад) залягае няглыбока пад левым схілам у даліну заходняга ручая і падзяляецца Рубяжанскім гасьцінцам бадай на дзьве роўныя часткі. Крэйда залягае на глыбіні ад 0,25 да 4,2 м, мае	38	№ 3	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				максымальную таўшчыню да 13,9 м, працяжнасьць адкладу ў большым напрамку да 520 м. Крэйда неаднолькавая ва ўсёй масе па сваёй якасьці і ўласьцівасьцях. Запас дасьледчык вылічае ў 850,000 тон.			
5	401	Крэйда	м. Койданава, саўгас Дзягільна	Трэці паклад крэйды (паўночны) знаходзіцца на N ад другога і направа ад Рубяжанскага гасьцінцу на глыбіні 10,2 м ад паверхні зямлі. Сьвідраваная прабоіна прайшла па крэйдзе 2,55 м, не перарэзаўшы яе. Адклады крэйды ў гэтым месцы належным парадкам не дасьледваны.	38	—	н. р.
6	171	Крэйда	вёска і ст. чыгункі Негарэлае	Вядомыя яшчэ з мінулага стагодзьдзя абгаленьні крэйды знаходзяцца ў адлегласьці $3^1/_2$ клм на SW ад чыгуначнай станцыі Негарэлае ля саўгасу Бакінава. Крэйда залягае на глыбіні ад 4—7 м і перакрываецца флювіягляцыяльнымі пяскамі ад 2 да 3 м і морэнавым чырвона-бурым суглінкам ад 2 да 4 м. Таўшчыня крэйды невядома, запасы ня вызначаны. Раней былі значныя распрацоўкі для вывазу крэйды на гуту ў Старым Сяле.	38	№ 6	Распрацоўваліс на гуту
				№ 43—34. Копыскі раён.			
1	249	Маргель	в. Лёшча	Маргэль сьветла-шэрага, белага і сіняватага колеру таўшчынёю да 1,0 м знойдзен у абгаленьні раўчуку, які праходзіць праз вёску Лёшчу. Тоўшча і перакрыша маргелю ў залежнасьці ад часткі ўзвышша зьмяняецца.	6	№ 67	Сялянскія распрацоўкі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	250	Маргель	в. Сьмётанка	Маргель шэры, белы, сіняваты, таўшчынёю ад 1,0—2,0 м. Перакрыша ад 2 да 6 м і больш у залежнасьці ад часткі ўзвышша. У значнай ступені найлепшая частка ўзвышша распрацавана.	6	№ 68	Распрацоўваўся
3	248	Маргель	в. Леўкі	Маргель сьветла-шэры і больш цёмнага колеру ад 2 да 6 м таўшчыні заўважан у кар'еры ў в. Леўкі. Перакрыша іншымі пародамі ад 1 да 2 м. Працяжнасьць забою кар'еру да 50 м.	6	№ 64	Распрацоўваецца
4	247	Маргель	саўгас Леўкі	Маргель сьветла-шэрага колеру знаходзіцца ў абгаленьні левага борту раўчаку, які цягнецца па леваму берагу ракі Дняпро да ўтоку ў апошні.	6	№ 63	Сялянскія распрацоўкі
5	244	Маргель	в. Аляксандрыя	Маргель шэра-чырвонага колеру сустракаецца на ямах на ўзвышшах правага берагу ракі Дняпро. Не дасьледваны.	6	№ 53	Нязначныя распрацоўкі сялян
6	245	Маргель	г. Копысь	Па ўвалах левага берагу ракі Дняпро ў ваколіцах гораду Копысю сустракаецца маргель, які набываецца на завод для вырабу кахлі.	6	№ 57	Распрацоўваецца
7	246	Маргель	в. Стайкі	У абгаленьні высокага левага берагу ракі Дняпро залягае сьветла-шэрага колеру маргель у адлегласьці 0,25 клм ад саўгасу Стайкі і па ўзвышшы далей ад берагу ў напрамку на в. Стайкі. Адклады маргелю не вывучаліся.	6	№ 59	Сялянскія распрацоўкі ямамі
8	255	Трэпел	саўгас Леўкі	На ўзвышшы левага ўвалу ў саўгасе Леўкі выяўлены адклады трэпелу да 1 м таўшчыні ў шурфу; агульная таўшчыня невядома, перакрыцьцё	6	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				1,0 м. Па хэмічным аналізе, зробленым Хэмічным Інстытутам БАН, гэтыя трэпелы маюць да 80,0% SiO_2 (хэм. анал. № 45).			
9	256	Трэпел	в. Аляксандрыя	Адклады трэпелаў выяўлены на ўвалах правага берагу ракі Дняпро ў в. Аляксандрыя. Падрабязна не дасьледваны.	6	—	н. р.
10	254	Пясок	г. Копысь	У адлегласьці 5 клм ад г. Копысю па правым беразе р. Дняпро ўніз па рацэ знаходзіцца вельмі значны кар'ер, які ў забоі дае абгаленьне розных пяскоў, часткай косаслайковых з гравіевымі прапластаваньнямі да 12 м агульнае таўшчыні.	6	№ 73-84	Распрацоўка на баляст кіраўніцтвам чыгункі
11	235	Гліна	г. Копысь	У кар'еры па левым беразе р. Дняпро для набываньня гліны часткай для керамічнага заводу, а часткай для вырабу цэглы ў г. Копысі распрацоўваецца чырвона-буры морэнавы суглінак, плястычны, з невялікай колькасьцю валуноў.	6	№ 43	Распрацоўваюцца
12	236	Суглінак морэнавы	в. Лёшча	Чырвона-бурага колеру морэнавы суглінак вышаў у абгаленьні левага берагу ракі Дняпро ля в. Лёшчы ўбок ад дарогі на вёску Антонаўку.	6	№ 44	н. р.
13	237	Суглінак морэнавы	в. Сьмётанка	Чырвона-буры морэнавы суглінак, плястычны, з нязначнай колькасьцю валуноў і галькі абгаляецца ў правым баку раўчаку, які ўпадае зьлева ў р. Дняпро. Абгаленьне суглінку мае да 3 мэтраў таўшчыні. Перакрыша 1,5—2,0 мэтра. Працяг абгаленьня да 100 мэтраў.	6	№ 47	Сялянская распрацоўка ў нязначнай колькасьці

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 44—26. Коханаўскі раён.			
1	507	Пясок гравіевы	в. Лешава	Груба-зярнёвы пясок выходзіць у абгаленьні на S ад в. Лешавай у размыве ўзвышша. Таўшчыня назіраецца да 1,0 м; перакрыша 2,5 м.	26	Аб.75 № 3, 2, 1	н. р.
2	508	Пясок	м. Коханава	У абгаленьні берагу рэчкі вызначаецца сярэдня-зярнёвы, пластковы пясок да 3 м таўшчыні; у контакце з вышэйлежачым лёсаватым пяском трымае вапняковую гальку.	26	№ 30-31	н. р.
3	509	Суглінак морэнавы	в. Абольцы	Сьветла-буры морэнавы суглінак у абгаленьні на S ад в. Абольцы непасрэдна за сялібамі; мае таўшчыню ад 3 да 4 м.	26	Аб. 74, уз. № 315-316	н. р.
4	510	Суглінак морэнавы	в. Марцюхова	Сьветла-буры морэнавы суглінак залягае непасрэдна пад глебаю ў 1,5 клм на поўдзень ад в. Марцюховай.	26	Аб. 76, № 325-326	н. р.
				№ 45-70. Краснапольскі раён.			
1	417	Крэйда	в. Кажамякі	Знойдзена крэйда, лакуль што недасьледваная.	—	—	Вядзецца распрацоўка
				№ 46—33. Круглянскі раён.			
				№ 47—32. Крупскі раён.			
				№ 48—60. Крычаўскі раён.			
1	62	Вапняк палеозойскі	м. Крычаў	У адлегласьці 3 клм ад мястэчка на ўзвышшы правага берагу ракі Сажа ў мясцовасьці пад назваю Крамянка выйшлі на паверхню пласткі палеозойскіх вапнякоў, трымаючых, паводле азначэньня геолёга Армашэўскага, фаўну сярэдняга дэвону. Абгаленьне перакрыта ў сучасны	6,7	№ 1	Раней распрацоўваліся вапнякі і апальвалася вапна

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				некалькіх мэтраў, з аддаленасьцю ад ракі павялічваецца.			
7	72	Крэйда	в. Варанёва	Абгаленьне правага берагу ракі Сажа ля вёскі Варанёвай выяўляе наяўнасьць крэйдавага масыву да 8 м вышыні і 350 м даўжыні па беразе ракі. Перакрыша ў некалькі мэтраў таўшчыні з розных глін і пяскоў. Паводле хэмічнага складу крэйда зьяўляецца рознаю. Зьверху знаходзіцца вельмі добрая крэйда, маючая, згодна з хэмічнымі аналізамі, да 96,10% $CaCo_3$, ніжэй залягае гліністая крэйда і крэйдавы маргель. Дзякуючы вельмі добрым умовам знаходжаньня ля значнае ракі і непасрэдна ля чыгункі, гэтае абгаленьне зьяўляецца вельмі каштоўным.	8	№ 1—21	Расцрацоўка вядзецца ў вялікім маштабе. Крэйда ідзе на Варонеўскі крэйдавы завод
8	73	Крэйда	м. Крычаў	Адклады крэйды знаходзяцца ў абгаленьні правага берагу ракі Сажа, па цячэньні ніжэй м. Крычава. Крэйда выходзіць на некалькі м вышэй узроўню вады ў рацэ. Але значны апоўзак перашкаджае бліжэйшаму вывучэньню. Побач яшчэ ёсьць абгаленьні крэйды амаль што на ўзроўні вады ў рацэ, якія ня маюць практычнага значэньня.	7	№ 39	н. р.
9	74	Крэйда	в. Задабросьць	Крэйда выходзіць на 2-3 м вышэй узроўню вады ў рацэ ў абгаленьні правага берагу. Паверхня яе няроўная. Перакрыта крэйда сьвітай пяскоў і глін у некалькі м таўшчынёй.	6	№ 36 1—5 № 37 1—4	н. р.
10	75	Крэйда	в. Паклады	Правы бераг ракі Сажа вышэй вёскі Паклады дае абгаленьне ўзвышша, падмываванага ракою, у якім ніжнюю частку складае крэйда.	6	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
11	76	Крэйда	в. Паклады	Абгаленьні крэйды ў правым беразе ракі Сажа ля в. Паклады.	6	—	н. р.
12	77	Крэйда	в. Паклады	Значнае па сваіх памерах абгаленьне крэйды знаходзіцца ва ўзвышшы правага берагу ракі Сажа, у мясцовасьці так званая Панізоўская сенажаць. Крэйда ўздымаецца мэтраў на 8 вышэй узроўню вады ў рацэ і цягнецца ўздоўж ракі больш як 100 м. Перакрыта крэйда пяском і глінай у некалькі м таўшчынёй.	6	№ 38 1—5	н. р.
13	167	Крэмень	в. Задабросьць	У рачной гальцы і пяскох правага берагу ракі Сажа супроць в. Задабросьць знаходзяцца сьцяжэньні крэменя чорнага колеру.	7	—	н. р.
14	155	Пясок	в. Варанёва	Згуртаваньне пяскоў барханнага тыпу ў даліне ракі Сажа, вышэй маста чыгункі Ворша-Унеча на правым беразе ракі.	8	№ 36	н. р.
15	156	Пясок	в. Варанёва	Выдмавыя пяскі левага берагу ракі Сажа займаюць значную плошчу. Паасобныя бугрыны абгаленьня з паверхні з рэдкімі расьлінамі дасягаюць вышыні 11,0 м вышэй узроўню вады ў рацэ. Асабліва выяўлена плошча левага берагу даліны, пакрытая гэтымі пяскамі, супроць часовага драўлянага маста праз раку Сож ля вёскі Варанёвай.	8	Уз. № 37.	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
16	144	Пясок	м. Крычаў	Пясок кварцавы, белы 0,4—0,6 м таўшчыні пры перакрышы ад 4 да 6 м выходзіць у абгаленьні бартоў рава пад назваю Барысаў Лог на працяжнасьці больш 100 м.	7	№ 118	н. р.
17	133	Гліна	в. Нанаскава	Зеленавата-шэрая гляўконітатрымаючая гліна знойдзена ў абгаленьні левага берагу ракі Астра вышэй адкладаў крэйды. Таўшчыня яе розная, але ў некаторых мясцох, дзе паверхня крэйды больш роўная, адклады гліны маюць таўшчыню 0,2 м.	7	№ 74-75	н. р.
18	137	Гліна	в. Нанаскава	У верхняй частцы абгаленьня левага берагу ракі Астра пракінулася шэрая з жоўтымі вохрыстымі плямамі гліна, залягаючая вышэй адкладаў крэйды таўшчынёю да 1,5—3,0 м.	8	№ 74—77	н. р.
19	135	Гліна	м. Крычаў	Направа ад дарогі з Крычава ў вёску Касьцюшкавічы ва ўрочышчы Зацагельня на плошчы да 1,0 га сьвідранымі прабоінамі, зробленымі ў напрамку ад дарогі на Барысаў Лог, выяўлена пад нязначнай перакрышай тоўшча сінявата-блакітнай, у некаторых мясцох чакаляднага колеру, з чырвона-бурымі плямамі, тыповай палеозойскага ўзросту гліны. Тоўшча пройдзена на 3 м і цалкам не перарэзана. У гліне заўважаны прапластаваньні вапнякоў і вапняковых конглёмэратаў з рознай фаўнай. Гліна вельмі пластычная; умовы знаходжаньня спагадныя для распрацовак.	7	Сьв. пр. № 1—3	У нязначнай колькасьці раней распрацоўвалася да вырабу цэглы

№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
0	418	Суглінак морэнавы	м. Крычаў	Чырвона-буры морэнавы суглінак, з рэдкімі валунамі і галькай крышталёвых парод, знаходзіцца на значнай плошчы паміж мястэчкам і вакзалам чыгункі Ворша—Унеча, на ўзвышшы, ад дарогі з левага боку. Таўшчыня суглінку больш 4 м; залягае ад паверхні.	7	№ 69	н. р.
1	419	Суглінак морэнавы	в. Касьцюшкавічы	Чырвона-буры морэнавы суглінак з рэдкаю галькаю крышталёвых парод досыць аднастайны больш 4,9 м таўшчыні знойдзены ля дарогі на Крычаў у адлегласьці 1,0 клм ад в. Касьцюшкавічы.	7	Сьв. пр. № 4	н. р.
2	106	Буры жалязьняк	в. Бель П.	Буры жалязьняк сустракаецца паасобнымі згуртаваньнямі на пойменай тэрасе правага берагу ракі Сажа і непасрэдна ў рэчышчы ракі ля берагу.	8	№ 29	н. р.
3	107	Буры жалязьняк	м. Крычаў	Буры жалязьняк знойдзен на пойме ракі Сажа, паміж ракою і шосэ на Рослаў, у розных мясцох паасобнымі згуртаваньнямі.	6	№ 27	н. р.
4	121	Фасфарыты	в. Глушнёва	Фасфарытавыя конкрэцыі пяшчаністага тыпу раскіданы на палёх правага берагу ракі Сажа. Концэнтрацыя матар'ялу слабая.	7	№ 31	н. р.
				№ 49—30. Лагойскі раён.			
1	169	Крэйда	в. Крамянец	У ваколіцах вёскі Крамянец адклады крэйды вызначаны ў 5 абгаленьнях і ямах. Тры з іх дасьледчык лічыць уключанымі ў ледавіковыя пароды,	38	№ 15	Сялянскія распрацоўкі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				а два займаюць першапачатковае становішча. Адно з другарадных абгленьняў дае крэйду больш 7 м таўшчыні; перакрышка 1,5 м; працяг на сьценцы забою 22,0 м.			
2	402	Крэйда	в. Крамянец	Першы з карэнных выхадаў крэйды знаходзіцца на адлегласьці 0,8 клм на О ад вёскі Крамянец; у зробленай яме дае шэра-белую крэйду таўшчынёю ў 3,2 м, перакрышку суглінку і пяску дае ў 3,62 м; паказвае, што крэйда падсьцілаецца сьветла-шэрымі дробнымі пяскамі, па якіх сьвідраная прабоіна прайшла 0,4 м.	38	№ 8	Сялянскі распрацоўкі
3	403	Крэйда	в. Крамянец	Другі з карэнных выхадаў крэйды знаходзіцца на адлегласьці 2,0 клм на NO ад вёскі Крамянец, на левым беразе ракі Ільлі (вадазбор ракі Нёмну), ля хутара Баравое. Крэйда мае таўшчыню 4,15 м, перакрышка — 1,6 мэтраў; падсьцілае крэйду шэры дробны пясок.	38	№ 9	н. р.
4	184	Буры жалязьняк	в. Баравая	Балотная жалезная руда выходзіць на значным працягу ў адкладах поймы, а таксама і ў вадатоку ракі Ільлі. Жалязьняк досыць плотны, згодна папярэдняму хэмічнаму аналізу зьмяшчае $FeO+Fe_2O_3$ да 56,8% Fe.	42	—	н. р.
5	175	Валун вапняковы	в. Якубовічы	Вапняковыя валуны знойдзены ў ваколіцах вёскі Якубовічы і сумежнай вёскі Янушкавічы, галоўным, чынам на N ад гэтых вёсак.	42	—	—

№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
43	Валун вапняковы	в. Міхеды	Згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў грубых пяскох; недасьледванае.	36	—	—
187	Крыніцы жалезістыя	м. Лагойск	Жалезістыя крыніцы вызначаны досьледамі на левым беразе ракі Гайны ў мястэчку Лагойску, ля шляху на мястэчка Плешчаніцы. Некалькі крыніц прабіваюцца ўласна ў алюві Гайны вышэй цячэньня ракі.	7,42	—	Раней была пабудавана больніца
188	Торф лекавы	в. Гасьцілавічы	У балоце ля вёскі Гасьцілавічы заўважаны адклады лячэбных торфаў тыпу гіці.	7,42	—	н. р.
186	Маргель лугавы	в. Рудня	Адклады маргелю знаходзяцца на глыбіні 0,5 м на левым беразе ракі Гайны. Таўшчыня маргелю 2,5 м, плошча ня вызначана.	7	—	Распрацоўваюцца
			№ 50—92. Лельчыцкі раён.			
			№ 51—18. Лепельскі раён.			
309	Валун крышталёвых пород	м. Камень	Значныя згуртаваньні валуноў крышталёвых пород знаходзяцца ў ваколіцы мястэчка Камень; зьвязаны з пашырэньнем у гэтай мясцовасьці валуна-гліністых узвышшаў.	19	—	—
310	Пясок	г. Лепель	Пяскі дзюнавага паходжаньня на О і W ад гораду займаюць значныя плошчы паверхні зямлі да некалькіх кв. клм.	19	—	н. р.
			№ 52—97. Лоеўскі раён.			
288	Гліны вохрыстыя	в. Ісакавічы	Розныя вохрыстыя гліны і гляўконіт зьмяшчальныя пароды знаходзяцца ў урочышчы Ляхава Гара паміж вёскамі Ісакавічы і Кавіміраўка.	42	—	Распрацоўваюцца

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	289	Пясок	м. Лоеў	Адклады гляўконітавых пяскоў у раёне мястэчка Лоева, якія скарыстоўваюцца на выраб мінэральнай фарбы на заводзе Краскацьвет у Лоеве.	42	—	Распрацоўваюцца
				№ 53—47. Лупалаўскі раён.			
				№ 54—75. Любаньскі раён.			
1	445	Крэйда	в. Купнікі	Адклады крэйды дасьледваны горным аддзелам ВСНГБ у ўрочышчы Осьнікі на адлегласьці 1,0 клм на N ад в. Купнікі. Крэйда залягае лінзай і па краёх зьнішчаецца. Таўшчыня крэйды 11,9 м; падсьцілаюць яе зеленавата-шэрыя дробна-зярнёвыя пяскі таўшчынёю больш 1,1 м, з галькай кварцытаў і фасфарытаў. Перакрышка ад 0,3 да 3,2 м—галоўным чынам розныя пяскі.	41	№ 16/5	н. р.
2	446	Крэйда	в. Смальгоў	Крэйда дасьледвана і вызначана горным аддзелам ВСНГБ на плошчы ў 7,5 га ў урочышчы Новае Гурбішча на глыбіні ад 0,3 да 5,7 м. Таўшчыня крэйды нявызначана, але мае больш 8,0 м. Перакрываюць крэйду жоўтыя пяскі, ніжэй якіх (а ў некаторых выпадках вышэй) залягаюць дробна-зярнёвыя зеленавата-шэрыя пяскі.	41	№ 11/4	—
				№ 55—29. Ляднянскі раён.			
1	243	Гліна	в. Арловічы	Гліна чакаляднага колеру, карбонатная сустракаецца ў абгаленьні левага берагу ракі Дняпра ля вёскі Арловічы. Не дасьледвана.	14	№ 40	Распрацоўваецца

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 56—16. Лёзьнянскі раён.			
1	367	Суглінак морэнавы	м. Лёзна	Чырвона-буры морэнавы суглінак цалкам складае правы берег ракі Мацні таўшчынёю да 10,0 м; залягае непасрэдна пад глебай.	26	№ 227	н. р.
2	368	Суглінак морэнавы	в. Выгараўшчына	Чырвона-буры морэнавы суглінак складае ўзвышша даўжынёю да 3 клм у межах цэлага шэрагу вёсак і знаходзіцца ва умовах, спагадных для скарыстаньня. Таўшчыня значна больш 1,2 м.	26	№ 208—217	Вядзецца распрацоўка на выраб цэглы
3	54	Суглінак морэнавы	в. Чарніцы	Чырвона-буры морэнавы суглінак вышаў у берагавым абгаленьні рэчкі ля в. Чарніцы. Недасьледваны.	42	—	н. р.
4	50	Валун вапняковы	в. Сітна і Жукава ў 7 клм ад м. Бабінавічы	Паміж вёскамі Сітна і Жукава працягнуліся 4 роўналежныя паміж сабой узгоркі озавага паходжаньня да 1,0 клм даўжыні, пры 30,0 м шырыні і 0,5 м вышыні. Гэтыя ўзгоркі ўключаюць значны процант вапняковых валуноў.	26	—	Распрацоўваецца
				№ 57—46. Магілеўскі раён.			
				№ 58—85. Мазырскі раён.			
1	489	Буры жалязьняк	в. Буды	Па правы бок рэчкі бяз назвы, на сенажаці сустракаецца буры жалязьняк паасобнымі кавалкамі на плошчы да 1,0 га.	42	—	н. р.
2	286	Буры жалязьняк	в. Прудок	Па берагох рэчкі Прудок і на правым беразе ракі Прыпяці ў іх пойме знаходзяцца адклады бурага жалезьняку паасобнымі згуртаваньнямі.	42	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А.	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 59—39. Менск.			
1	409	Крыніцы мінэралізаваныя	г. Менск	Сьвідраная прабоіна № 4 на Эльводзе ў Менску, глыбінёю ў 353,8 м, дасягнула найглыбейшых паземаў на Беларусі і ня толькі дала мажлівасьць пазнаёміцца нам з геолёгічнымі адкладамі, невядомымі да апошняга часу, але яшчэ на глыбіні прыблізна ў 300 мэтраў у пескавікох дэвонскага пэрыоду выкрыла новы пазем, які даў самазьлівальную салоную воду. Згодна даных хэмічных аналізаў, зробленых Хэмічным Інстытутам БАН, салоная вада з гэтай прабоіны зьмяшчае ад 3,24 да 5,87 gr цьвёрдай астачы пры 110°C, ад 1,77 да 3,11 gr на 1 літар вады. Салонатрывалы пазем прабоінай ня пройдзены. Вада па якасьці слаба салоная і можа быць скарыстана з лекавымі мэтамі.	42	№ 1—10	Вывучаецца ў сучасны момант
2	180	Гліна	г. Менск	Чырвона-бурага і сіняватага колеру гліністая паасобнасьць морэны ў урочышчы Тучынка ў ваколіцах гораду.	15	№ 1—75	Расцраціоўваецца для вырабу цэглы
3	179	Гліна	г. Менск	Гліністая паасобнасьць морэнавага суглінку чырвонабурага колеру ў заходнім сэктары ў ваколіцах гораду.	15	№ 1—90	Расцраціоўваецца для вырабу цэглы
				№ 60—50. Мсьціслаўскі раён.			
1	65	Крэйда	в. Куравічы	Значнае абгаленьне левага берагу ракі Вехры ніжэй вёскі Куравічы. Крэйда вышла на 4-5 м вышэй узроўню вады ў рацэ і мае працяжнасьць уздоўж берагу да 100 м. Далей ад берагу моцная перакрышка розных парод. Па хэмічнаму складу розныя пласты крэйды зьмяшчаюць ад 75,60% да 93,46% $CaCo_3$ (хэм. анал. № 109 і 110).	9	№ 250—286	н. р.
2	66	Крэйда	в. Разанцы	Адно з найбольш важных абгаленьняў крэйды, якое зьмяшчае значныя запасы крэйды, знаходзіцца ў добрых умовах залягання. Без падрабязнага дасьледваньня можна вызначыць, што ўзвышша мае некалькі мільёнаў тон крэйды вышэй узроўню грунтовых вод. Вышыня абгаленьня крэйды над паверхняй вады ў рацэ Вехры больш 14,1 м. Перакрышка ад 1,0 да некалькіх мэтраў; далей ад берагу павялічваецца. Розныя пласткі крэйды маюць розны характар. Па хэмічнаму складу згодна аналізам, зробленым Хэмічным Інстытутам БАН, адклады крэйды з гэтага абгаленьня зьмяшчаюць ад 84,18% да 94,57% $CaCo_3$ (хэм. анал. № 101 і 98).	7,9	№ 42—172	н. р.
3	67	Крэйда	Уроч. Барок	Абгаленьне крэйды вышынёю да 8,5 м. на крутым схіле ўзвышша правага берагу ракі Сажа ў урочышчы Барок, на 200 мэтраў ніжэй маста праз раку Сож. Зьверху крэйда перакрыта пяскамі і чырвонабурым морэнавым суглінкам да 2.1 м агульнай таўшчыні.	7,9	№ 393—416	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				У сумежнасьці крэйда пракідаецца яшчэ ў некалькіх мясцох, што сьведчыць аб яе значным пашырэньні ў гэтым месцы. Крэйда ў розных пластох мае розную якасьць. Па даных хэмічных аналізаў Хэмічнага Інстытуту БАН адклады крэйды зьмяшчаюць ад 82,84% да 89,75% $CaCo_3$ (хэм. анал. № 143 і 139).			
4	69	Крэйда	в. Парадзіна	У тых мясцох, дзе рака Сож падмывае свой правы бераг, в. Парадзінай знаходзіцца два значных абгаленьні розных пород, якія дапамагаюць вызначыць будову гэтага ўзвышша. Тут, у першую чаргу, трэба адзначыць моцныя адклады крэйды да 6,0 м. вышэй узроўню вады ў рацэ Сажы працягам удоўж ракі ў некалькі сот мэтраў. Перакрыцка крэйды розная. У ніжэйшым абгаленьні меншая, у вышэйшым значна большая. Без дэталёвых дасьледваньняў можна лічыць значныя запасы ў некалькі мільёнаў тон крэйды ў гэтым узвышшы. Якасьць крэйды ў розных пласткох розная. Па хэмічнаму аналізу Хэмічнага Інстытуту БАН розныя адклады крэйды зьмяшчаюць ад 74,64% да 90,48% $CaCo_3$ (хэм. анал. № 150 і 146).	6,9	№ 417—444 і № 466—496	н. р.
5	68	Крэйда	в. Каўшова	Абгаленьне крэйды да 2,0 м вышыні працяжнасьцю да 10,0 м знаходзіцца ў раўчаку, які ў двох паасобных напрамках праразае ўзвышша правага берагу ракі Сажа, трохі	6,9	№ 145—465	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				ніжэй в. Каўшовай. Абгаленьне нязначнае па велічыні. Крэйда мае значную перакрышку пяскоў і морэнавых суглінкаў. Згодна хэмічных аналізаў Хэмічнага Інстытуту БАН крэйда зьмяшчае ад 79,5% да 83,3% $CaCo_3$ (хэм. анал. № 153 і 154).			
6	64	Валуны вапняковыя	г. Мсьціслаў	Згуртаваньне вапняковых валуноў сярод гравійных пяскоў і галечнікаў, якія падсьцілаюцца чырвона-бурым морэнавым суглінкам, вызначана ў абгаленьнях моцных раўчакоў, пад назваю Цялячых Равоў, па правым беразе ракі Вехры, у 1,0 клм вышэй гораду. Агульная колькасьць вапнякоў на адзінку аб'ёму невялікая. Перакрышка іншых пород значная—да 8,0 м пры таўшчыні гравійных пяскоў у 1,37 м. Распрацоўка адных вапнякоў немэтазгодна.	6,9	№ 239—247	Распрацоўвалася кустарнай арцельлю
7	116	Фасфарыты	г. Куравічы	Фасфарытавыя галькі сустракаюцца ў другарадных умовах знаходжаньня, сярод галькі чацьвярцёвых адкладаў, у раўчаку ля крэйдавага абгаленьня, па левым беразе ракі Вехры, у сумежнасьці з вёскай Куравічы. Прамысловага значэньня ня маюць.	6	—	н. р.
8	117	Фасфарыты	г. Мсьціслаў	Фасфарытавыя конкрэцыі пескавата-шэрага колеру і гліністыя чорнага колеру сустракаюцца сярод галькі крышталёвых пород і вапнякоў у гравійных пяскох, якія папыраны на значнай плошчы. Прымаючы пад увагу перакрыць-	6	Уз. № 73 і 75	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				це розных парод, таўшчыню гравійных пяскоў, узбагачэньне іх фасфарытамі, трэба лічыць, што наогул згуртаваньні гэтых фасфарытаў ня маюць прамысловага значэньня. Абгаленьні адкладаў з гэтымі фасфарытамі знаходзяцца па Шамаўскім шляху і вызначаюцца ў Цялячых Равох на правым беразе ракі Вехры. Згодна даных хэмічных аналізаў конкрэцыі шэрага пяшчаністага фасфарыту зьмяшчаюць ад 16,0% да 17,0% P_2O_5 (хэм. анал. № 13 і 16—БДУ), у той час як чорныя гліністы фасфарыты, павінна быць юрскага часу, зьяўляюцца вельмі багатымі і зьмяшчаюць да 30,12% P_2O_5 (хэм. анал. № 14—БДУ).			
9	118	Фасфарыты	г. Мсьціслаў	Фасфарытавыя конкрэцыі шэрага пескаватага тыпу знойдзены па равох на Траецкай Гары, дзе ўмовы знаходжаньня іх тыя самыя, што ў Цялячых Равох. Прамысловага значэньня ня маюць.	6	№ 106	н. р.
10	115	Фасфарыты	в. Пячкоўка	На палове схілу ўзвышша левага берагу ракі Вехры, у гравійна-галечых адкладах сярод галькі крышталёвых парод і вапнякоў вызначана дамешка конкрэцый шэрага пескаватага фасфарыту. Колькасьць нязначная. Прамысловага значэньня ня мае.	6	—	н. р.
11	119	Фасфарыты	Уроч. Барок	Фасфарытавыя конкрэцыі пяскавата-шэрага колеру, добра акатаныя, знойдзены ў галечніках правага берагу ракі	6	№ 121	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				Сажа, у ўрочышчы Барок. Дамешка фасфарыту невялікая. Прамысловага значэньня ня маюць.			
12	120	Фасфарыты	в. Парадзіна	Галечнікі чацьвярцёвых адкладаў зьмяшчаюць конкрэцыі шэрага пескаватага фасфарыту ў невялікай колькасьці. Заўважаны ў абгаленьні правага берагу ракі Сажа ля вёскі Парадзіна. Па хэмічнаму складу і зьмяшчэньню P_2O_5 набліжаюцца да Мсьціслаўскіх пяшчаністых фасфарытаў.	6	№ 117	н. р.
13	130	Гліна флёрыдынавая	в. Парадзіна	Гліны сьветла і цёмна-зялёнага колеру перакрываюць адклады крэйды; маюць таўшчыню да 0,75 м і па сваіх уласьцівасьцях зьяўляюцца флёрыдынамі. Радыёактыўны. Па хэмічнаму складу набліжаюцца да лепшых узораў па клясыфікацыі Бэнсмана (хэм. анал. № 15 і 62).	6	№ 135	н. р.
14	132	Гліна флёрыдынавая	в. Каўшова	Гліны тыпу флёрыдынаў перакрываюць адклады крэйды і маюць таўшчыню да 0,6 м; уключаюць гальку акатанага крэменю і астачы чарапашак. Па хэмічнаму складу набліжаюцца да Парадзінскіх флёрыдынаў.	6	№ 137	н. р.
15	511	Суглінак морэнавы	в. Мазалоўшчына	У абгаленьні супроць грэблі ў в. Мазалоўшчыны заўважана тоўшча рознага колеру суглінкаў, якія перакрываюць чырвона-буры морэнавы суглінак таўшчынёю да 6,9 м. Агульная таўшчыня суглінкаў 8,65 м.	33, 12	№ 41—49	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
16	512	Суглінак морэнавы	в. Беразуйка	Чырвона-буры марэнавы суглінак з невялікімі ўключэньнямі пяску сьветла-жоўтага колеру, таўшчынёю 1,6 м, вышаў у абгаленьні левага берагу ракі Белай Натопы ў раўчаку на шляху ў вёску Пляткава.	12	№ 125—128	н. р.
17	513	Пясок	в. Лізарава	Пясок груба-зярнёвы з уключэньнямі галькі крышталёвых пород сьветла-жоўтага колеру знаходзіцца ў моцным абгаленьні да 15,0 м левага берагу ракі Белай Натопы.	12	№ 16	Сялянскія распрацоўкі ямамі
18	514	Лёс	в. Касмынічы	Абгаленьне лёсу да 3,5 м. таўшчыні знаходзіцца ў рове левага берагу ракі Белай Натопы супроць вёскі Касмынічы.	12	№ 18	н. р.
19	515	Лёс	в. Саханава	Абгаленьне лёсу больш 6,55 м на правым беразе ракі Белае Натопы ля в. Саханавай.	12	№ 30—33	н. р.
20	113	Лёс	г. Мсьціслаў	Значныя тоўшчы лёсу, які займае вышэйшы гіпсамэтрычны ўзровень, перакрываюць вадападзел і схілы ўзвышша і добра могуць вывучацца па раўчакох, якія ў цэлым шэрагу месц перараз аюць узвышша правага берагу ракі Сажа ў ваколіцах гораду Мсьціслаўлю. Асабліва добры лёс можна скарыстаць у Цялячых Равох, дзе тоўшча яго дасягае 4,0—6,0 мэтраў у паасобных абгаленьнях	6,9	№ 295-296	н. р.
21	114	Лёс	в. Парадзіна	Значныя тоўшчы лёсу перакрываюць узвышша правага берагу ракі Сажа, даючы	6,9	№ 711—723	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				ў абгаленьнях берагу простастаўныя сьценкі да 6,0 м вышыні. Парода тыповая сьветла-жоўтага колеру, няпластавая.			
22	516	Травэрцыны	в. Белішчына	Травэрцыны знаходзяцца ў раўчаку правага берагу ракі Асьленкі ніжэй па цячэньні ад в. Белішчыны і не даходзячы в. Асьленкі. У глыбокім рове ля маленькага ручайка травэрцыны даюць абгаленьне да 4,0 м таўшчыні. Агульная маса нязначная. Гэтыя вапняковыя туфы паводле хэмічнага складу зьяўляюцца найбольшымі чыстымі карбонатамі кальцыю. Па хэмічных аналізах Хэмічнага Інстытуту БАН туфы маюць ад 95,59% да 97,07% $CaCo_3$(хэм. анал. № 59, 60 і 61).	9	—	н. р.
				№ 61—7. Мяжанскі раён.			
1	369	Галечнік	в. Тарчылава	Галечнік знаходзіцца на паверхні палёў у ваколіцах в. Тарчылавай.	26	—	н. р.
				№ 62—94. Нараўлянскі раён.			
1	492	Маргель лугавы	в. Вербавічы	Лугавы маргель сьветла-шэрага колеру сустракаецца на балоціне, ва ўрочышчы Журжава, на плошчы 0,75 га на глыбыні 0,25—0,50 м і мае таўшчыню да 0,25 м.	23	№ 1	Сяляне набываюць на пабелку хат
2	493	Маргель лугавы	в. Вербавічы	Лугавы маргель сьветла-шэрага колеру знаходзіцца на балоціне ва ўрочышчы Лясішча, у адлегласьці ад вёскі на 1,5 клм на SO, на плошчы прыблізна 0,65 га на глыбыні 0,25—0,50 м і мае таўшчыню 0,25 м.	23	№ 2	Сялянскія нязначныя распрацоўкі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	491	Маргель лугавы	в. Галоўчыцы	Бела-жаўтаватага колеру маргель вышаў на працяжнасьці ад 10 да 15 м у глінакопішчы на глыбіні 1,0 м.	23	№ 10	н. р.
4	494	Буры жалязьняк	в. Гамарня	Буры жалязьняк знаходзіцца ў пойме правага берагу рэчкі Славешні паасобнымі згуртаваньнямі на працяжнасьці берагу да 140 мэтраў.	23	№ 3	Раней распрацоўваўся, была рудня
5	495	Гліна	в. Дзёрнавічы	Ва ўрочышчы Гліняныя Масткі паміж в.в. Дзёрнавічы, Вяпры і Бярозаўкай залягае плястычная жоўта-шэрая з валунамі крышталёвых парод гліна таўшчынёю да 1 м на плошчы да 70 га.	23	№ 4	н. р.
6	499	Суглінак	в. Бярозаўка	Чырвона-буры морэнавы суглінак, залягае непасрэдна ля вёскі на плошчы 2,0 га таўшчынёю да 1,0 м ля самай паверхні зямлі.	23	№ 5	Ёсьць сялянская цагельня
7	496	Суглінак	в. Галоўчыцы	Чырвона-буры морэнавы суглінак знаходзіцца ў абгаленьні ля вёскі Галоўчыцы на глыбіні 0,4 м і мае таўшчыню да 1,0 м. Цягнецца адклад суглінку ў абгаленьні 40—50 м.	23	№ 9	Распрацоўваецца на выраб цэглы
8	498	Суглінак	в. Барбароў	Па беразе ракі Прыпяці паміж вёскаю Барбароў і колгасам Серп і Молат вышаў у абгаленьні чырвона-буры морэнавы суглінак таўшчынёю 2,0—4,0 м, даўжынёй ад 30 да 40 м.	23	№ 13	н. р.
9	497	Суглінак	в. Петрапаўлаўская Слабада	Шэрага колеру суглінак з валунамі таўшчынёю да 2,5 м знаходзіцца ў абгаленьні на баку раўчака на глыбіні 1,0 м ад паверхні зямлі і мае ў даўжыню да 27,0 м.	23	№ 11	Скарыстоўваецца сялянамі на пабелку хат

№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
			№ 63—77. Парыцкі раён.			
17	Гліна	в. Нова-Беліца	Умовы знаходжаньня гліны не вывучаліся.	42	—	—
			№ 64—82. Петрыкаўскі раён.			
228	Торф старадаўні	в. Лескавічы	Адклады старадаўняга торфу выяўлены ля прыстані Лескавічы, па левым беразе ракі Прыпяці. Торф залягае на 4,0 м вышэй узроўню паверхні вады ў раце і ідзе глыбей у ваду. Уздоўж берагу ракі торф працягнуўся на 0,25 клм. Перакрыша складаецца сыпнымі барханнымі пяскамі да 6,0 м таўшчыні.	34	—	н. р.
			№ 65—22. Плешчаніцкі раён.			
42	Валун вапняковы	в. Прусавічы	Досыць значнае згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў грубых пяскох. Не дасьледвана.	36	—	—
46	Валун вапняковы	в. Слабодка	Згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў грубых пяскох. Не дасьледвана.	36	—	—
45	Валун вапняковы	в. Зарэчча	Згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў грубых пяскох ля вёскі Зарэчча. Не дасьледвана.	36	—	—
			№ 66—5. Полацкі раён.			
270	Пясок	Жэлецкая гута „Труды“	Вылужаныя чацьвярцёвыя пяскі знойдзены ў ваколіцах заводу паасобнымі лінзамі. Запасы нязначныя. Распрацоўваецца лінза да 1,5 м таўшчыні ў адлегласьці 2 клм ад заводу.	33	№ 107	Распрацоўваецца

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	269	Пясок	г. Полацак	Пясок кварцавы выходзіць у абгаленьні на левым беразе ракі Палаты—правай прытокі ракі Заходняй Дзьвіны ў межах гораду.	19	—	н. р.
3	277	Суглінак морэнавы	в. Шматава	На правым беразе ракі Заходняй Дзьвіны знаходзіцца ў абгаленьні чырвона-буры морэнавы суглінак ля вёскі Шматавай.	21	№ 31	н. р.
4	311	Валун крышталёвых пород	в. Ропна	У значнай колькасьці сустракаюцца валуны і галька крышталёвых пород ля вёскі Ропны. Плошча, на якой яны сустракаюцца, яшчэ не вывучалася.	21	—	—
5	312	Валун крышталёвых пород	в. Хахлы	У ваколіцах вёскі Хахлы ў значнай колькасьці знаходзяцца валуны і галька крышталёвых пород.	21	—	—
6	313	Гліна	в. Рудня пад Арцэйкавічы	Гліна чакаляднага колеру плястычная, таўшчынёй больш 2,0 м, заўважана на плошчы да 10,0 га. Перакрыша на частцы плошчы нязначная.	21	№ 141	Раней была цагельня
7	314	Гліна	в. Захарнічыхі Стрыкілі	Гліна чакаляднага колеру вельмі плястычная да 6,0 м таўшчыні распаўсюджана на плошчы да 3—4 га. Перакрыша нязначная.	21	№ 127	н. р.
8	315	Гліна	в. Янкава	Гліна чырвона-бурага колеру, плястычная, да 1,5 м і больш таўшчыні, знаходзіцца на плошчы палёў гэтай вёскі на левым беразе ракі Палаты.	21	№ 120	—
9	316	Гліна	в. Громы	Тоўшча чырвона-бурае гліны паводле даных меркаваньняў дасьледчыка да 10,0 м таўшчыні знойдзена ля в. Громы. Плошча пашырэньня да 5,0 га.	21	№ 170	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
10	278	Гліна	г. Полацак	Гліна чырвона-бурага колеру, тлустая, залягае ў кар'ерах цагелень пластком больш 2,0 м таўшчыні без перакрышы.	21	№ 69	Распрацоўваецца, ёсьць 2 цагельні
11	317	Гліна	г. Полацак	Па левым беразе рэчкі Палаты, у адлегласьці аднаго клм ад гораду Полацку заўважаны ў абгаленьні моцныя цёмнашэрыя і цынамонавыя гліны, да 5,0 м, агульнае таўшчыні, ва ўрочышчы Касавэрыя.	33	№ 17—19	н. р.
12	318	Гліна	в. Глінішчына	Гліна чырвона-бурага колеру, плястычная, таўшчынёю больш 1,5 м залягае на плошчы больш 2 га ля вёскі Глінішчына.	21	№ 610	Распрацоўваецца, ёсьць цагельні
13	319	Гліна	в. Падроўшчына	Паводле меркаваньня дасьледчыкаў на плошчы да 1,0 га знаходзіцца плястычная чырвона-бурая гліна да 1,0 м. таўшчынёю ў ваколіцы вёскі Падроўшчына.	21	№ 162	Ужываецца ганчарамі на выраб пасуды
14	320	Гліна	в. Кароўнікі	Чырвона-бурая гліна таўшчынёю да 7,0 м залягае на значнай плошчы ля вёскі Кароўнікі.	21	№ 259	н. р.
15	321	Гліна	в. Хлевішчы	Чырвона-бурая гліна, таўшчынёю больш 2,0 м, пашырана на плошчы 3—5 га.	21	№ 86	Сялянск. распрацоўка для выраб пасуды
16	322	Гліна	в. Шоўкава	Чырвона-бурая гліна таўшчынёю больш 1,5 м залягае на значнай плошчы. Часткай перакрыта зьверху нязначнае таўшчыні пяскамі.	21	№ 257	н. р.
17	323	Гліна	в. Піруцына	Гліна чырвона-бурага колеру, да 3,0 мэтраў таўшчыні, сярэдня-плястычная, залягае на плошчы ў некалькі дзесяткаў га.	21	№ 500	—

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
18	324	Гліна	Саўгас Раговічы	Гліна плястычная, чакалядзнага колеру, таўшчынёю да 3 м, знойдзена ля саўгасу Раговічы, плошча не дасьледвана.	21	№ 842	—
				№ 67—58. Прапойскі раён.			
1	223	Долёміт палеозойскі	м. Прапойск	У канцы мястэчка, на дарозе ў Гайшын, паміж больніцай і могілкамі, у шурфе выяўлена наяўнасьць двух пласткоў вапняку палеозойскага ўзросту: вышэйшы 0,64 м таўшчыні, ніжэйшы ўзяты да глыбіні 0,4 м, далей ня пройдзены. Паводле хэмічнага складу гэтыя вапнякі належаць да долёмітаў, бо маюць па даных Хэмічнага Інстытуту БАН ад 31,57% да 32,43% CaO і ад 16,86% да 17,55% MgO (хэм. анал. №№ 124, 123).	7	№ 42/3	н. р.
2	224	Долёміт палеозойскі	м. Прапойск	Долёміты знаходзяцца яшчэ ў стане паасобных масываў у двух мясцох на правым беразе ракі Сажа, на плошчы занятай сялібамі. Адначасна заўважаны тут нацёкі зялёнае гліны і апоўзкі дробна-зярнёвых гляўконітавых пяскоў.	7	№ 42/1	н. р.
3	225	Долёміт палеозойскі	м. Прапойск	Абгаленьне долёмітаў таго самага характару ля будынку, раней занятага паштовай канторай.	7	№ 42/4	н. р.
4	201	Крэйда	в. Чырвоная Слабада	Абгаленьне крэйды па правым беразе р. Проні на 2 клм вышэй в. Чырвоная Слабада.	14	—	н. р.
5	189	Крэйда	м. Прапойск, правы бераг рэчкі Сажа і Проні	Крэйда вышла крыху вышэй узроўню вады на правым беразе р. Проні і часткай па дну ракі.	6	№ 321	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
6	190	Крэйда	в. Барсукоўка	Высокі правы бераг ракі Сажа, вышэй пераразаючага яго рава ва ўрочышчы Вапельня, дае абгаленьне крэйды даўжынёю да 150 м і вышэй летняга ўзроўню вады ў рацэ ад 3 да 4 м. Паверхня крэйды няроўная. Перакрыша другіх парод ля берагу некалькі м далей павялічваецца.	6,9	№ 333—343	У апошні год рабіліся пробныя выемкі; раней апальвалася вапна
7	191	Крэйда	в. Барсукоўка	Рака Сож падмывае правы бераг 0,5 клм ніжэй рава ва ўрочышчы Вапельня і амаль што супроць в. Барсукоўка і дае абгаленьне крэйды да 300 м даўжыні, 4—6 м вышэй узроўню вады ў рацэ, перакрытае рыхлымі адкладамі ў некалькі м таўшчыні.	6,9	№ 345	н. р.
8	192	Крэйда	м. Гайшын	Значнае абгаленьне крэйды на правым беразе ракі Сажа вышэй мястэчка Гайшына даўжынёю да 850 м, вышэй узроўню вады ў рацэ м на 10. Перакрыша парод ля берагу нязначная, некалькі мэтраў далей ад берагу павялічваецца. Абгаленьне крэйды досыць значнае.	8,9	№ 314—348	н. р.
9	193	Крэйда	м. Гайшын	Высокі правы бераг ракі Сажа, перарэзаны некалькімі равамі, дае значнае абгаленьне крэйды, якое падмываецца ракой ніжэй мястэчка Гайшына. У некаторых мясцох стромкія сьценкі крэйды зьмяняюцца спадзістымі схіламі ўвалаў і ўтвараюцца лугавіны. Абгаленьні крэйды цягнуцца наогул больш кілёмэтра. Вышыня некалькі м над узроўнем вады. Перакрыша ля берагу,	6,7	№ 57 і 58	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				некалькі м далей павялічваецца. Паколькі паверхня крэйды няроўная, тоўшча перакрываючых парод розная. Паводле даных хэмічнага аналізу крэйда з гэтага абгаленьня зьяўляецца гліністай і мае толькі 83,97% $CaCo_3$ (хэм. анал. № 31).			
10	212	Маргель	в. Таўкачоўка	У адлегласьці 1,5 клм ад берагу ракі Сажа і 0,25 клм вышэй вёскі Таўкачоўкі на ўзвышшы знаходзіцца адклады чырвона-шэрага колеру пескаватага маргелю.	6	В.	Распрацоўваўся раней для заводу, вырабляўшага кахлю ў в. Таўкачоўцы
11	213	Маргель	в. Таўкачоўка	Маргель знаходзіцца ніжэй вёскі на 0,25 клм, на правым беразе ракі Сажа ў кар'еры 600×100 м, адкуль раней браўся маргель на завод для вырабу кахлі.	6	С. 1—4	Распрацоўваўся раней для вырабу кахлі
12	217	Буры жалязьняк	в. Чырвоная Слабада	У пойме ракі Проні на глыбіні да 0,25 м паасобнымі згуртаваньнямі.	14	№ 69	н. р.
13	220	Буры жалязьняк	в. Старынка	На сенажаці ў пойме левага берагу ракі Сажа ў мясцовасьці, маючай назву Рудакопішча, прыблізна ў 3-х клм ад в. Старынкі паасобнымі згуртаваньнямі.	6	№ 39	н. р.
14	219	Буры жалязьняк	в. Крэмянка	У абгаленьні левага берагу ракі Сажа, па-за сялібамі ў канцы вёскі Крэмянкі паасобнымі згуртаваньнямі.	6	№ 31	н. р.
15	218	Буры жалязьняк	м. Прапойск	На значнай плошчы ў пойме рэк Сажа і Проні ў тых мясцох, якія не закрануты раней-	6	№ 31	Распрацоўваўся раней

№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А.	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
			шымі значнымі распрацоўкамі бурага жалезьняку для існаваўшага мэталюргічнага заводу.			у значным маштабе
205	Пясок	в. Устанае	У абгаленьні правага берагу ракі Рэсты, непасрэдна ля вёскі Устанае.	14	№ 63	н. р.
204	Пясок	в. Харанёва	Пясок сьветла-шэры ў абгаленьні левага берагу ракі Рэсты, ля ўтоку яе ў раку Проню, на дарозе Прапойск-Магілеў.	14	№ 64	н. р.
210	Гліна	в. Харанёва	Зялёна-шэрая гляўконітавая гліна ў абгаленьні правага берагу ракі Проні.	14	№ 60	н. р.
211	Гліна	м. Прапойск	Палеозойскага ўзросту вельмі пластычная, аднародная, зялёнага колеру гліна залягае паміж двума пласткамі вапнякоў. Мае таўшчыню да 0,2 м. Заўважана ў шурфу пры выезьдзе з мястэчка па дарозе на Гайшын, паміж больніцай і могілкамі.	7	№ 42/2	н. р.
207	Гліна	м. Гайшын	Гліна зялёна-шэрага колеру гляўконітавая, таўшчынёю ад 0,5 да 1,0 м, перакрывае адклады крэйды, выходзіць на паверхню ў розных мясцох.	6	№ 59	н. р.
226	Фасфарыт	в. Барсукоўка	Галечнік розных парод таўшчынёю ў двух пласткох да 1,5 м, маючы конкрэцыі шэрага пескаватага фасфарыту, залягае ля паверхні і выходзіць у абгаленьні берагу ракі вышэй крэйды. Фасфарыт пераадкладзены і сустракаецца тут у нязначнай колькасьці. Адклады побач не вывучаліся.	8	№ 349—351	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
22	214	Крэмень	в. Крэмянка	На левым беразе ракі Сажа ў гальцы на палёх сустракаюцца сьцяжэньні крэменю чорнага колеру, пакрытыя зьверху сьветла-шэраю абалонкаю памерам усярэднім ад 3 да 12 сантымэтраў.	6	—	Сяляне зьбіраюць крэмень для заводу
				№ 68—52. Пухавіцкі раён.			
1	174	Валун вапняковы	в. Кавалевічы	Валун вапняковы заўважан у значнай колькасьці ня толькі ў ваколіцах вёскі Кавалёўкі, але і ў суседніх вёсках Левановічы і Барбур'е.	36	—	—
				№ 69—67. Рагачэўскі раён.			
1	447	Крэйда	в. Кісьцяні	Адклады крэйды займаюць ніжэйшы гіпсамэтрычны ўзровень і выходзяць у дне ракі Дняпро, прыблізна 2,5 клм вышэй вёскі Кісьцяні ля выселку Дняпроўскага.	35	—	Крэйда набываецца сялянамі
2	448	Крэйда	в. Кісьцяні	Адклады крэйды знаходзяцца на левым беразе ракі Дняпро, на дне русла старой пратокі, так званага Старыка ў урочышчы Крупля.	35	—	Крэйда набываецца сялянамі
3	449	Пясок	в. Шчыбрын	Сярод паверхневых адкладаў маюць значнае пашырэньне сьветла-жоўтыя дробназярнёвыя баравыя пяскі, якія назіраюцца па раўчакох на значнай плошчы.	35	—	н. р.
4	8	Буры жалязьняк	г. Рагачоў	Адклады бурага жалезьняку знойдзены пашыранымі пасобнымі згуртаваньнямі на пойме правага берагу ракі Дняпро, трохі вышэй цагельні.	6	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
5	13	Гліна	в. Лучына	Гліна знаходзіцца на правым беразе ракі Дняпро, непасрэдна побач з сялібамі вёскі. Не дасьледвана.	—	—	—
6	523	Гліна	в. Фалевічы	Цёмна-шэрая да сьветла-шэрай, часткай жаўтаватая з вохрыстымі плямамі і жылкамі гліна залягае на слаба-забалочанай лагчыне, плошчаю ад 5 да 7 га, на глыбіні ад паверхні 0,25—0,50 м. Таўшчыня пласту гліны вагаецца ад 1,5 да 3,0 м. Вясною і восеньню распрацоўваць яе нельга, бо плошча заліваецца вадою. Пабудавана цагельня, на якой апальваецца цэглы да 0,5 міл. штук у год.	23	№ 16	Распрацоўваецца для мясцовае цагельні
7	524	Гліна	в. Вірычава	Цёмна-шэрая да чорнага з бурымі вохрыстымі плямамі і пяшчанымі пражылкамі ў верхняй частцы пласта гліна, знойдзена на працягу 100—120 м у вурочышчы Крэмянічная Гара, на правым беразе ракі Друці, ля дрэвапагрузнае прыстані. Таўшчыня пласту ў абгаленьні ад 3,0 да 3,5 м.	23	№ 17	Сялянскі выраб у нязначных памерах
8	21	Суглінак морэнавы	г. Рагачэў	Па ўзвышшах правага берагу ракі Дняпро сустракаецца на значнай працяжнасьці ў шэрагу абгаленьняў чырвонабуры морэнавы суглінак і побач з ім на тым-жа гіпсамэтрычным узроўні вышаў шэры марэнавы суглінак. Таўшчыня суглінку розная. У тых выпадках, дзе яны не замяшчаюцца ў большай або меншай ступені пяскамі, дасягаюць да 8,0 м.	6	Абг. № 71 73 і 76	Распрацоўваецца для цагельні
9	482	Суглінак	в. Канапліцы	Чырвона-буры морэнавы суглінак залягае ў двух пластках	23	№ 6	Сялянскія распра-

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				агульнай таўшчыні да 3,6 м і мае даўжыню ў абгаленьні да 80 м.			цоўкі для вырабу цэглы-сырцу
10	483	Суглінак	в. Касьцюшкавічы	Чырвона-буры з зацёкамі шэрага морэнавы суглінак выступае ў абгаленьні левага берагу ракі Друці пластком да 4.0—6,0 м таўшчыні, даўжынёй 1,2 клм уздоўж берагу ракі.	23	№ 2	Нязначныя сялянскія распрацоўкі да вырабу цэглы-сырцу
11	480	Суглінак	в. Азяраны	Па правым беразе ракі Друці ў абгаленьнях вышаў чырвона-буры морэнавы суглінак таўшчынёю да 5,0—6,0 м, даўжынёй 1,5 клм.	23	№ 13	Нязначныя сялянскія распрацоўкі да вырабу цэглы-сырцу
12	481	Суглінак	в. Радамысьль	Непасрэдна ля самай вёскі Радамысьль з усходняга боку ў глінакопішчы вышаў чырвона-буры морэнавы суглінак таўшчынёю да 2,0 м пад перакрышаю розных парод агульнай таўшчыні ад 0,5 да 2,0 м.	23	№ 9	Выкарыстоўваецца насельніцтвам вёскі да вырабу цэглы-сырцу
13	479	Суглінак	в. Рэкта	У абгаленьнях правага берагу ракі Друці на працягу 150—200 м вышаў чырвона-буры морэнавы суглінак таўшчынёю да 3,0—4,0 м.	—	—	—
14	525	Суглінак морэнавы	в. Кашара	Чырвона-буры морэнавы суглінак з валунамі, досыць вязкі, знойдзены на глыбіні ад 0,5 м да 1.0 м ад паверхні зямлі ў зьніжанай мясьціне пры балоце, занятай часткай пад поле ў адлегласьці 0,5 клм	23	№ 23	Распрацоўваецца сялянамі для сваёй патрэбы

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				ад в. Кашары ля дарогі з гэтае вёскі на шосэ Бабруйск-Рагачэў. Таўшчыня пласту больш 5 м, плошча знаходжаньня больш 9 га.			
15	484	Валун крышталёвых парод	в. Блізьняцы	Валуны крышталёвых парод сустракаюцца на паверхні і ў масе бура-жоўтага жалезістага пяску да глыбіні 1,0—2,0 м.	23	№ 4	Нязначныя сялянскія распрацоўкі
				№ 70 3. Расонскі раён.			
1	325	Буры жалязьняк	в. Сельнікі	Па левым беразе ракі Дрысы на палёх вёскі Сельнікі знойдзены паасобныя згуртаваньні бурага жалезьняку да 0,25 м таўшчыні. Вызначаная плошча пашырэньня бурых жалезьнякоў невялікая.	33	—	н. р.
2	326	Буры жалязьняк	в. Кіслухі	Па рэчцы Марыніцы левай прытоцы ракі Дрысы ў шэрагу месц на пойме ракі знойдзены паасобныя згуртаваньні бурага жалезьняку да 0,25 м таўшчыні.	33	—	н. р.
3	327	Гліна істужкавая	в. Прыхабы	Пад перакрышай пяскоў у 1,5 м залягае сьвіта істужкавых глін да 2,0 м таўшчыні на левым беразе ракі Дрысы ля вёскі Прыхабы.	33	—	н. р.
4	328	Суглінак морэнавы	в. Сівошына	Пад перакрышай пяскоў да 3,0 м залягае чырвона-буры морэнавы суглінак каля 4,0 м таўшчыні ля маста праз раку Дрысу бліз вёскі Сівошынай.	33	№ 415	н. р.
5	329	Маргель лугавы	в. Гарэліца	Па абодвух берагох ракі Дрысы паміж пластком торфу 0,5 м таўшчыні і ніжэйлежачым галечнікам залягае сінявата-белы лугавы маргель з	33	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				астачамі расьлін і ракушкамі малюскаў таўшчынёю ад 0,15 да 1,0 м на значнай плошчы.			
6	330	Маргель лугавы	в. Дэмэх	На левым беразе ракі Дрысы ад вёскі Дэмэх у напрамку на вёску Краснапольле на значнай плошчы залягае пад торфам лугавым маргель такі самы як у вёскі Гарэліцы.	33	—	н. р.
7	331	Маргель лугавы	в. Рум	На сенажаці па ручаі Гравы пад расьлінным пластком заўважаны пласт лугавога маргелю таўшчынёю да 1,0 м.	33	—	н. р.
				№ 71—49. Расьнянскі раён.			
				№ 72—86. Рэчыцкі раён.			
1	291	Гліна	в. Маладуша	Адклады гліны раней распрацоўваліся. Не дасьледваны.	42	—	Была раней цагельня
2	290	Гліна	в. Бярозаўка	Адклады гліны ля вёскі Бярозаўкі раней распрацоўваліся; не дасьледваны.	42	—	Была раней цагельня
3	287	Гліна	г. Рэчыца	У ваколіцах гораду распрацоўваюцца адклады гліны, недасьледваныя да сучаснага моманту.	42	—	н. р.
				№ 73—11. Сіроцінскі раён.			
1	379	Валун крышталёвых пород	в. Лазоўка	Валуны крышталёвых пород раскіданы па палёх на значнай плошчы ня толькі ў ваколіцах вёскі Лазоўкі, але і іншых сумежных, як, напр., Дарожкавай, Старынкі, Барсучыны, Ражаны, Скавародзішча, Будніцы, Кады і Івашчэнкі.	16	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	371	Валун крышталёвых пород	в. Бор	Валуны крышталёвых пород раскіданы па палёх у ваколіцы вёскі Бор на плошчы больш 20 га.	16	—	н. р.
3	372	Граві	в. Бунцікі	Граві залягае на плошчы да 3 га ва ўрочашчы Сяргеева Ляда на паверхні пластом ад 1,5 да 2,0 м таўшчыні.	16	—	Распрацоўваўся раней для вырабу бэтонавых труб
4	373	Суглінак морэнавы	в. Слабодка	Чырвона-буры морэнавы суглінак абгаляецца ва ўзвышшах па дарозе з мястэчка Сіроціна ў горад Віцебск, ля в. Слабодка ва ўрочышчы Арандаваныя Палосы.	16	—	н. р.
5	374	Пясок	в. Лаваш	У кар'еры на схіле ўзвышша, па якому праходзіць дарога з вёскі Залесьсе ў в. Лаваш да возера Гарадзец вышаў пясок таўшчынёю да 3,0 м пад морэнавым суглінкам да 1,8 м таўшчыні.	26	—	Распрацоўкі часткай былі
6	375	Галечнік	в. Барсучына	Галечнік знаходзіцца на палёх па абодвух бакох дарогі з в. Барсучыны ў вёску Палячкі.	26	№ 80	н. р.
				№ 74—64. Слуцкі раён.			
1	280	Крэйда	в. Балочыцы	На S ад в. Балочыцы ў адлегласьці 1,5—2,0 клм у некалькіх мясцох распрацоўваюцца адклады крэйды. Сьвідраванай прабоінай выяўлена, што таўшчыня крэйды тут больш як 13,0 м. Перакрыша іншых пород 1,4—1,6 м.	39	№ 9/II	Распрацоўваюцца

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	281	Крэйда	в. Хацінава	У адлегласьці 0,75 клм на S ад вёскі Хацінава залягае крэйда на глыбіні 0,7—1,1 м і мае таўшчыню больш 8,2 м. Падрабязна яшчэ не вывучалася.	39	№ 12	н. р.
3	450	Суглінак морэнавы	в. Цалевічы	Чырвона-буры морэнавы суглінак таўшчынёю звыш 2,0—3,0 м залягае на значнай плошчы ў ваколіцах вёскі Цалевічы і выходзіць у абгаленьнях у роўных мясцох, напрыклад, у канцы вёскі ля колгасу Трактар і інш.	11	№ 76/II	н. р.
4	451	Суглінак морэнавы	в. Белічы	У ваколіцах в. Белічы на значнай плошчы таўшчынёю да 3,5 і больш м залягае чырвона-буры морэнавы суглінак.	11	№ 5/II	н. р.
5	452	Суглінак морэнавы	в. Вялікія Сьлівы	Чырвона-буры морэнавы суглінак, у некаторых частках пераходзячы у больш пластычную без валуноў масу, знаходзіцца на плошчы 4,0—5,0 га ля вёскі Вялікія Сьлівы і дасягае таўшчыні да 2 м.	11	№ 9	Раней была цагельня
6	453	Суглінак морэнавы	в. Дарасіна	У ваколіцах вёскі Дарасіной чырвона-буры морэнавы суглінак перакрыты зьверху пяскамі, заўважаны на плошчы 4,0—5,0 га. Таўшчыня суглінку да 2,0 м.	11	№ 18	н. р.
7	454	Пясок	в. Вялікія Сьлівы	Гравіевы пясок да 2,0 м таўшчыні знаходзіцца ля вёскі Вялікія Сьлівы на плошчы 7,0—8,0 га.	11	№ 3	н. р.
8	455	Буры жалязьняк	в. Цараўцы	На забалочаных мясцох у ваколіцах вёскі Цараўцы заўважаны паасобныя нязначныя згуртаваньня бурага жалязьняку.	11	№ 83	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 75—40. Смалявіцкі раён.			
1	177	Валун вапняковы	в. Каменка	У ваколіцах в. Каменкі ў значнай колькасьці знойдзены вапняковыя валуны сярод валуноў крышталёвых парод, што дало магчымасьць распрацоўваць іх для мясцовых патрэб.	36	—	Распрацоўваліся
2	176	Валун вапняковы	в. Шпакоўшчына	Валун вапняковы сустракаецца на плошчы да 5 га ў адлегласьці 1,0—1,5 клм ад в. Шпакоўшчыны. Валун больш буйны, чым у другіх мясцох побач. Запас падлічаны прыблізна ў 150 міл. клг. Таўшчыня пяскоў з валунамі 2 м.	22	—	Распрацоўваецца
3	185	Валун вапняковы	в. Мельянава	Згуртаваньне вапняковых валуноў озавае будовы ля в. Мельянавай, у 9 клм на NW ад мястэчка Смалявіч, паводле даных дасьледчыка больш значнае за суседнія.	22	—	Распрацоўвалася
4	404	Валун вапняковы	в. Чарніцы-Вапеньні	Згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі знаходзіцца ва ўрочышчы Вапеньне ў 6-7 клм на SO ад мястэчка Смалявіч на плошчы да 1,0 га пры таўшчыні грубых пяскоў, уключаючых вапнякі, у 1,0 м.	22	—	Распрацоўваецца
5	405	Валун вапняковы	в. Замосьце	Згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі знаходзіцца ў 3-х клм на N ад вёскі Замосьце і ў адным клм ад Лясьнічоўкі, 62-63 кварталу. Згуртаваньне вапнякоў мае озавы характар.	22	—	Распрацоўваецца
6	182	Суглінак морэнавы	в. Чорны Лес	Значная плошча занятая чырвона-бурым морэнавым суглінкам ля вёскі Чорны Лес. Перакрыша нязначная. Не дасьледвана.	22	—	Сялянскія распрацоўкі ямамі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 76—65. Стара-Дароскі раён.			
1	3	Долёміт палеозойскі	в. Радуцічы	Абгаленьне долёмітаў, якія адносяць да верхняга дэвону, знаходзіцца на ўзвышшах 5-6 м вышэй суседняе плошчы на левым беразе ракі Пцічы, на SO ад паселішча Града і на NO ад вёскі Радуцічы ва ўрочышчы Мачынск. Бліжэйшая станцыя чыгункі Дараганава знаходзіцца ў 6 клм. Назіраная таўшчыня долёмітаў да 4 м; занята долёмітамі каля 0,5 га. Згодна з данымі хэмічных аналізаў, зробленых Хэмічным Інстытутам БАН, гэтыя долёміты маюць ад 55,16% да 54,34% $CaCo_3$ і ад 40,86% да 41,45% $MgCo_3$ (хэм. анал. № 225 і 226).	3 30 40	—	Долёміты распрацоўваліся раней для апальваньня вапны
2	285	Валун вапняковы	в. Радуцічы	Адзначаецца згуртаваньне вапняковых валуноў і галькі ў ваколіцах вёскі Радуцічы і станцыі чыгункі Дараганавай.	42	—	—
				№ 77—74. Старобінскі раён.			
1	282	Крэйда	в. Пагост	Пад заходнім канцом могілак ля вёскі Пагост знойдзена крэйда таўшчынёю 0,6 м на глыбіні 2,0 м. Ніжэй крэйды залягаюць гляўконітавыя пароды: зеленавата-шэрыя пяскі і гліны.	39	—	—
2	227	Маргель вазёрны	в. Князь-Возера	Адклады вазёрнага маргелю знойдзены на паўночным беразе возера Князь, а таксама на N ад в. Князь-Возера. Таўшчыня маргелю 0,6 м, залягае ён на глыбіні 0,1 м, падсьцілае чырвона-буры морэнавы суглінак.	36	—	—

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	456	Галечнік	в. Чапялі	На ўзвышшы 15—20 м вышынёю, якое працягнулася з O на W і знаходзіцца на S ад вёскі Чапялі, знойдзены адклады груба-зярнёвых пяскоў гравію і галечніку з рэдкімі валунамі. У большасьці матар'ял складаецца крышталёвымі пародамі.	11	№ 68-69, 71—73	н. р.
4	457	Галечнік	в. Кутня	Ля в. Кутня знаходзіцца ўзвышша озавага паходжаньня да 15 м вышыні, выцягнутае ў напрамку з O на W, складзенае з грубых пяскоў гравію, галечніку і паасобных валуноў, галоўным чынам, крышталёвых парод. Узвышша прасочана на даўжыню да 500 м, шырыня дасягае 150 м пры вышыні ў 15,0 м	11	№ 22—24	Распрацоўваецца
5	458	Галечнік	в. Цёсава	Узвышша, якое цягнецца з вёскі Цёсавай у напрамку на в. Пагост, таксама дае згуртаваньне грубых гравіевых пяскоў, галоўным чынам, галечніку крышталёвых парод і паасобных валуноў. Заўважана прысутнасьць валуноў і галькі вапнякоў. Прасочана ўзвышша на 300 м у даўжыню пры 10 м шырыні.	11	№ 33-34	Нязначная распрацоўка.
6	459	Пясок	в. Дубен	Значнае пашырэньне сьветла-жоўтых адсартаваных баравых пяскоў на плошчы паміж вёскай Дубен і мястэчкам Старобін.	11	—	н. р.
7	460	Пясок	м. Старобін	Эолевага паходжаньня адклады бязгалечных пяскоў пашыраны ў ваколіцах мястэчка Старобіна. Пяскі кварцавыя, сьветла-жоўтага колеру.	11	№ 41	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
8	461	Пясок	в. Сакавічы	Пяскі кварцавыя сьветла-жоўтага колеру значна пашыраны на паверхні зямлі ў ваколіцы вёскі Сакавічы, асабліва ў напрамку на саўгас Трасьцянец.	11	№ 36	н. р.
9	462	Суглінак	в. Крывічы	На S ад вёскі Крывічы ва ўрочышчы Загорскае знаходзіцца суглінак чырвона-бурага колеру на плошчы 3,0—4,0 га таўшчынёю звыш 2,0 м.	11	№ 24/II	н. р.
10	463	Суглінак морэнавы	в. Жабін	Ля вёскі Жабін у зьніжаных частках рэльефу пракінуўся ў шэрагу месц чырвона-буры морэнавы суглінак. Таўшчыня суглінку да 3,0 м; вучасткі плошчы да 3 га.	11	№ 64	н. р.
11	464	Суглінак морэнавы	в. Мількавічы	Прыблізна ў 4,5 клм на NW ад вёскі Мількавічы ва ўрочышчы Заглінае залягае чырвона-буры морэнавы суглінак таўшчынёю да 1,0 м на плошчы ў 15 га.	11	—	Распрацоўваецца. Пабудована цагельня.
12	465	Буры жалязьняк	м. Старобін	На працягу 60 м. знойдзены адклады бурага жалезьняку на абодвух берагох ракі Случы на 3 клм ніжэй па рацэ мястэчка Старобіна.	11	№ 57-58	н. р.
				№ 78—13. Сураскі раён.			
1	376	Пясок	в. Казловічы	Непасрэдна пад глебай значна пашыраны сьветла-жоўты баравы пясок на працяжнасьці ад в. Казловічы да возера Ціоста.	26	№ 29	н. р.
2	377	Валун крышталёвых парод	в. Мялынь	Поле валуноў крышталёвых парод знаходзіцца ля берагу ракі Усьвячы непасрэдна ля вёскі.	26	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	378	Валун крышталёвых парод	в. Кошчына і Трэйчына ля в. Кароўка	Плошча, на якой пашыраны валуны крышталёвых парод, знаходзіцца паміж пералічанымі вёскамі на плошчы ў 400 кв. м, налічана 150 валуноў.	26	—	н. р.
4	379	Валун крышталёвых парод.	в. Любшына.	Поле валуноў знаходзіцца на W ад дарогі, якая ідзе ад могілак в. Любшына ў напрамку да ракі Заходняй Дзьвіны.	26	—	н. р.
5	380	Гліна	г. Сураж	Істужкавыя гліны абгаляюцца ў правым беразе ракі Касплі пад суглінкамі і пяскамі агульнай таўшчыні да 4,0 м. Нагляданая таўшчыня істужкавых глін да 3,0 м.	26	—	Распрацоўваюцца
6	57	Гліна	м. Янавічы	Істужкавыя гліны таўшчынёю больш 2,5 м знойдзены на плошчы да 0,25 га на беразе возера ў адлегласьці 1 клм ад мястэчка.	26	№ 54-55	Распрацоўваюцца
				№ 79—54. Сьвіслацкі раён.			
1	33	Валун крышталёвых парод	в. Бальшыя Каменічы	Валуны, галоўным чынам, крышталёвых парод знойдзены ў ваколіцах в. Бальшыя Каменічы ў ледавіковым суглінку.	39	—	Сялянскія распрацоўкі
2	34	Валун крышталёвых парод	в. Малыя Каменічы	Валуны, галоўным чынам, крышталёвых парод заўважаны на палёх у ваколіцы в. Малыя Каменічы, зьвязаны з адкладамі морэнавага суглінку.	39	—	—
3	466	Суглінак морэнавы	в. Закоркі	На плошчы 5—6 га на W ад в. Закоркі залягае чырвона-буры морэнавы суглінак з валунамі і галькай крышталёвых парод таўшчынёю ў 6,0 і больш м.	11	№ 24	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжанне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
4	25	Суглінак морэнавы	в. Халуі	У ваколіцах вёскі Халуі і па ямах ля дарогі заўважаны чырвона-буры морэнавы суглінак.	39	—	н. р.
5	26	Суглінак морэнавы	м. Сьвіслач	Чырвона-буры морэнавы суглінак знаходзіцца сярод іншых адкладаў на значнай плошчы ў ваколіцах мястэчка Сьвіслач і выходзіць у шэрагу абгаленьняў па ўзвышшах берагу ракі.	39	—	Распрацоўваецца
6	467	Суглінак морэнавы	колгас Новае Жыцьцё	У адлегласьці 1,0 клм на W ад саўгасу Новае Жыцьцё знаходзіцца чырвона-буры морэнавы суглінак нявызначанае таўшчыні пад пяскамі да 1,0—1,5 м таўшчыні.	11	№ 29	н. р.
7	6	Жалязьняк чырвоны	в. Ямнае	Па даліне Крывавага ручая, правай прытокі ракі Бярозы, ля в. Ямнае, прыблізна ў 5,0—5,5 клм на N ад мяс. Сьвіслач на глыбіні 30—45 см пад шчыльным пластком бурага жалезьняку залягае яскрава-чырвоны пласток сухога парашкаватага гематыту.	39	—	н. р.
				№ 80—43. Сьмілавіцкі раён.			
				№ 81—20. Сянскі раён.			
1	381	Валун крышталёвых пород	в. Кавалі	Валуны крышталёвых пород знаходзяцца на N ад бальшаку ў 1,0 клм на W ад в. Кавалі. На плошчы да 0,5 га налічана 150 буйных валуноў.	26	—	—
2	382	Валун крышталёвых пород	в. Асінаўка	Валуны крышталёвых пород знаходзяцца на палёх у ваколіцах вёскі Асінаўкі і цэлага шэрагу суседніх вёсак, як, напр.: Сукроўны, Лесьнікаў, Духінкі, Навасёлак, Гіра і Дубнікаў.	16	—	Сялянскія распрацоўкі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжанне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	383	Галечнік	в. Казюціна	Галечнік назіраецца ў перарэзе озавага ўзвышша вышынёю да 1,0 м у папярочніку да 50—60 м ля ўзьлеску хваёвага бору на NW ад в. Казюцінай. Абгаленьне паказвае, што ўзвышша мае значную масу галечніку.	26	№ 285—288	н. р.
4	384	Галечнік	в. Асінаўка	Галечнік, галоўным чынам, крышталёвых пород, хаця ёсьць дамешка і вапняку, сустракаецца на плошчы да 90 га ў ваколіцах в. Асінаўкі. Запасы галечніку вельмі значныя.	26	№ 294—296	н. р.
5	385	Суглінак	в. Мялешкі	Безвалуновы чырвона-буры морэнавы суглінак дробнымі вапняковымі конкрэцыямі і сьцяжэньнямі на беразе рэчкі ля в. Мялешкі.	26	№ 278	н. р.
6	386	Суглінак	в. Цыплякі	Пескаваты морэнавы суглінак складае галоўную частку некалькіх падзеленых западзінамі ўзвышшаў да 20 м вышыні, якія працягнуліся паралельна ў напрамку NW ля в. Цыплякі.	26	№ 127	н. р.
7	58	Суглінак	в. Кавалі	Плястычная безвалуновая адмена морэнавага суглінку, пераходзячая далей ад вёскі ў тыповы цынамонава-чакалядны морэнавы суглінак, вызначана ля в. Кавалі. Плошча, занятая суглінкам, да 0,5 га; таўшчыня да 4,0 м, перакрыша — шэры кварцавы пясок 1,0 м.	26	№ 109, 110—111	Нязначныя сялянскія распрацоўкі ямамі
8	387	Пясок	в. Аболь	Сьветла-жоўты кварцавы пясок таўшынёю 1,3 м у кар'еры плошчаю да 500 кв. м на О ад в. Аболь у адлегласьці 0,75 клм.	26	№ 107	Нязначныя распрацоўкі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
9	388	Пясок	в. Аляксандраўка	Пластковыя пяскі з шматлікімі лінзамі гравію і галькі знаходзяцца на N ад в. Аляксандраўкі, дзе складаюць узвышша да 7,0 м вышыні, 30 м шырыні, даўжынёй да 1,0 клм.	26	№ 120, 121—122	н. р.
10	389	Пясок гравіевы	в. Студзенка	Пясок груба-зярнёвы з уключэньнем гравіева-галечнага матар'ялу, у якім галоўную частку складаюць вапняковыя і долёмітавыя адмены, сустракаецца на дарозе ў адлегласьці 0,5 клм ад в. Студзенка ў кар'еры да 2,5 м вышыні і 20 м даўжыні па сьценцы забою.	26	№ 113	Нязначныя распрацоўкі
11	390	Маргель лугавы	в. Чырвоны Ручаёк	На балоце на нязначнай глыбіні ля в. Чырвоны Ручаёк, паводле слоў сялян, знаходзіцца лугавы маргель, у часе досьледаў затоплены вадой ад дажджоў і дзеля таго не дасьледваны.	26	—	н. р.
12	391	Маргель *вазёрны*	в. Сукроўна	Па ўсходнім і паўднёва-*ўсходнім берагох возера Су*кроўна (Плаўна) на плошчы больш 2 га таўшчынёю да 0,75 м пад глебаю альбо торфам знаходзіцца вазёрны маргель.	4	№ 290	н. р.
13	392	Маргель лугавы	в. Малыя Ульянавічы	Лугавы маргель залягае пад глебай 0,3 м і мае таўшчыню да 0,5 м па зробленай канаве, працяжнасьць вызначаецца да 0,5 клм.	16	—	н. р.
				№ 82—25. Талачынскі раён.			
14	259	Пясок	в. Стаўкі	Пясок кварцавы, значна зьбяднелы на тленьнік жалеза, знойдзен на ўзвышшы ля в Стайкі ў адлегласьці 400 м ад сяліб. Пясок залягае пасобнымі лінзамі.	6	№ 2	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
2	260	Пясок	в. Сяркавіцы і Шкляная Гута	Кварцавы пясок, зьбяднелы на тленьнік жалеза, сустракаецца лінзамі да 0,5 м таўшчыні і 50 м даўжыні сярод адкладаў торфу на балоце Бук. Запасы пяскоў нязначныя.	6	№ 3	Часткай распрацоўваецца на выраб шкла
3	261	Чырвоны жалязьняк	в. Сяркавіцы	На паверхні тарфяных адкладаў у некаторых мясцох на балоце Брук сустракаюцца лінзы рознаафарбаванага, ад сьветла-чырвонага, чырвона-бурага да цёмна-чырвонага колеру, зямлістага гематыту (чырвонага жалезьняку) таўшчынёю ад 5 да 15 см; матар'ял добры, але запасы нязначныя.	6	№ 4	н. р.
4	517	Валун крышталёвых пород	в. Воласава	Валуны крышталёвых пород знаходзяцца на палёх в. Воласавай і сумежных вёсак, як, напр.: Ліцьвякоў, Харлінкі, Плючаўкі і Бутароў. Лічаць, што ў в. Воласавай можна сабраць да 150 кубоў каменю.	16	—	н. р.
5	518	Суглінак	в. Воласава	Чырвона-буры морэнавы суглінак вышаў на паверхню зямлі; назіраецца на плошчы да 0,25 га таўшчынёю да 1,5 м.	16	Абг. № 12 Уз. № 1	—
				№ 83—91. Тураўскі раён.			
				№ 84—87. Уваравіцкі раён.			
				№ 85—51. Узьдзенскі раён.			
1	178	Гліна	м. Магільна	На левым беразе ракі Нёмну на дарозе з мястэчка Магільна ў в. Галавачы.	42	—	—

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 86—23. Халопеніцкі раён.			
				№ 87—96. Хойніцкі раён.			
1	486	Буры жалязьняк	в. Загальле	На плошчы балота да 100 га на глыбіні 1,0 м ва ўрочышчы Паташня залягае буры жалязьняк. Адклады маюць розную таўшчыню, залягаюць паасобнымі згуртаваньнямі.	42	—	—
2	487	Гліна	в. Барысаўшчызна	Вядзецца распрацоўка гліны для вырабу цэглы. Адклады не дасьледваны.	42	—	Працуе цагельня
3	292	Гліна	в. Рудакоў	Адклады гліны, якія раней распрацоўваліся. Не дасьледваны.	42	—	—
				№ 88—72. Хоцімскі раён.			
1	63	Вапняк палеозойскі	в. Сасноўка	Разборны вапняк, у значнай ступені долёмітызаваны, знаходзіцца на ўзвышшы правага берагу ракі Бесядзі на нязначнай адлегласьці ад сялібы ў мясцовасьці пад назваю Сасноўка. Вапняк разборны ў кавалках востракутных з кулак велічынёю. Колькасьць і ўмовы знаходжаньня не дасьледваны. Паводле хэмічных аналізаў, зробленых Хэмічным Інстытутам БАН, вапняк з гэтага абгаленьня мае 29,7% CaO і 17,39% MgO (хэм. анал. № 235).	8	№ 239	
2	158	Маргель	в. Цярпілаўка	Крэйдавы маргель пракідаецца на значных плошчах на палёх у 0,5 клм адлегласьці ад в. Цярпілаўкі па дарозе на в. Васькоўку.	8	№ 20	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	159	Маргель	в. Ельня	Крэйдавы маргель заўважаны на палёх саўгасу ў ваколіцах в. Ельні і на ўзроўні цячэньня рэчкі Аленкі ў абгаленьні берагу.	8	№ 206—208	Нязначныя сялянскія распрац. ямамі
4	161	Маргель	в. Канава	Абгаленьне крэйдавага маргелю знойдзена на левы бок дарогі з в. Мосін-Стан у в. Канаву.	8	№ 21	н. р.
5	161	Маргель	в. Шаладонаўка	Больш значнае абгаленьне крэйдавага маргелю на паверхні зямлі заўважана ля в. Шаладонаўкі.	8	—	н. р.
6	146	Пясок	в. Бесядзкі Прудок	Ва ўзвышшах правага берагу ракі Бесядзі на адлегласьці 1,5 клм у напрамку на в. Баханы выйшаў значнай таўшчыні тэхнічны белы кварцавы пясок. Выяўленая таўшчыня больш за 6 м; сапраўдная—невядома. Даўжыня абгаленьня пяскоў каля 240 м. Умовы спагадныя для мэханізацыі здабычы пяску.	8	№ 209—227	н. р.
7	147	Пясок	в. Ганнаўка	Па абгаленьнях левага берагу рэчкі Алёнкі ніжэй в. Ганнаўкі, да ўтоку яе ў раку Бесядзь на працяжнасьці 1,0 клм выйшлі белыя тэхнічныя кварцавыя пяскі назіранай таўшчыні да 5 м; сапраўдная—невядома. Перакрыша розных парод да 4,5—5,0 м.	8	№ 241	н. р.
8	111	Буры жалязьняк	в. Баханы	Буры жалязьняк невялікімі згуртаваньнямі знаходзіцца на пойменай тэрасе правага берагу ракі Бесядзі ніжэй могілак і ля самага берагу ракі.	8	№ 240	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 89—90. Церахоўскі раён.			
				№ 90—48. Чавускі раён.			
1	199	Крэйда	в. Брадзінічы	Крэйда выходзіць у бок ад дарогі на Чавусы ў аллегласьці, прыблізна, 5 клм ад апошняй.	14	№ 60	н. р.
2	200	Крэйда	в. Усушак	Крэйда пракідаецца сярод балота ў зьніжанай мясцовасьці на дарозе з Прапойску ў Магілеў.	14	№ 81	н. р.
3	203	Пясок	в. Брадзінічы	Белы кварцавы пясок з гляўконітам таўшчынёю больш 1,0 м залягае над крэйдай.	14	№ 59	н. р.
4	206	Гліна	в. Скварск	Гліна шэра-бурага колеру значна пескаватая некарбонатная знойдзена ў абгаленьні правага берагу ракі Проні непасрэдна ля в. Скварск. У верхняй частцы пласту знаходзяцца шматлікія дробныя ўключэньні вівіяніту.	14	№ 61	н. р.
				№ 91—24. Чарэйскі раён.			
1	519	Валун вапняковы	в. Паласкі	Праводзіцца распрацоўка вапняковых валуноў і галькі. Умовы знаходжаньня ня выяўлены. Плошча не дасьледвана.	42	—	—
2	520	Валун вапняковы	в. Абзер'е ля м. Лукомлю	Вапняковы валун і галечнік у ледавіковых адкладах на W ад м. Лукомлю ля в. Абзер'е.	16	—	Распрацоўваецца на ўгнаеньне глебы
3	521	Маргель вазёрны	в. Калінаўка	Адклады маргелю таўшчынёю 0,2—0,3 м знаходзяцца ў даліне рэчкі Лукомлькі сярод найноўшых пасьлятрацьцёвых вазёрна-рэчных адкладаў ля в. Калінаўкі.	4	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А.	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
4	522	Маргель вазёрны	в. Старыя Лаўкі	Маргель светла-шэрага колеру таўшчынёю 0,2—0,3 м сустракаецца сярод пасьлятрацьцёвых адкладаў па даліне рэчкі Югны ля в. Старыя Лаўкі.	4	—	н. р.
				№ 92—56. Чачавіцкі раён.			
1	476	Крэйда	в. Баркі	Пад чырвона-бурым морэнавым суглінкам на нязначнай глыбіні знаходзяцца адклады крэйды ва ўрочышчы Барок, пакуль што яшчэ не дасьледваныя.	4	—	н. р.
				№ 93—80. Чачэрскі раён.			
				№ 94—19. Чашніцкі раён.			
1	393	Маргель лугавы	в. Сасьнякі	Па даведках выяўлена прысутнасьць, відаць, лугавога маргелю ва ўрочышчы Вапенная Гара на плошчы да 5 га. Дасьледваньні ня зроблены.	16	—	Сялянскія распрацоўкі
2	394	Крыніцы мінэралізаваныя	в. Мяжыца	Серна-жалезістыя крыніцы на правым беразе ракі Вулы ва ўрочышчы Ржаўка ля в. Мяжыцы. Артэзыянскія струмені ўздымаюцца на беразе невялікага тарфянога балотца на плято, адкуль выцякае рака.	19	—	—
3	55	Суглінак морэнавы	м. Чашнікі	Чырвона-буры морэнавы суглінак заўважаны ля мястэчка Чашнікаў. Былі нязначныя распрацоўкі. Не дасьледваны.	42	—	Распрацоўваўся
4	395	Гліны істужкавыя	м. Чашнікі	Па правым беразе ракі Вулы ва ўрочышчы Ржавішча ля мястэчка Чашнікаў знаходзіцца сьвіта істужкавых глін, якія скарыстоўваюцца на выраб пасуды.	34	—	Распрацоўваюцца ганчарамі

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				№ 95—14. Чырвона-Слабодзкі раён.			
1	468	Крэйда	в. Гулевічы	Крэйда залягае на палёх на О ад в. Гулевічы на плошчы 1,25 га ва ўрочышчы Загуменнае. Таўшчыня крэйды розная, у некаторых мясцох больш 8,0 м. Перакрыша ад 0,2 да 4,0 м.	41	Пр. № 4/5	Распрацоўваецца
2	469	Крэйда	в. Жылі-хава	На схіле да NO плошчы, на якой пабудавана в. Жылі-хава ў канцы вёскі знаходзяцца абгаленьня крэйды, складаючай, відаць, паасобныя лінзы. Крэйда не дасьледвана.	11	№ 49/II	н. р.
3	470	Пясок	в. Жылі-хава	Пясок белы кварцавы дробна-зярнёвы добра адсартаваны залягае ў западзінах верхняй паверхні адкладаў крэйды. Знойдзены ў абгаленьні. Падрабязна не дасьледваны.	11	№ 50	н. р.
4	471	Пясок	в. Чырвоная Слабада	У ваколіцах в. Чырвоная Слабада значна пашыраны сьветла-жоўтага колеру павярхневыя пяскі. У некаторых мясцох наглядаецца дамешка да іх галечніку і валуноў.	11	№ 35-36/II	н. р.
5	472	Суглінак	в. Вайцэхоўка	У адлегласьці 2 клм ад в. Лютавічы на SW ад в. Вайцэхоўкі знаходзіцца чырвонабуры морэнавы суглінак таўшчынёю звыш 2,0 м на плошчы 3,0—4,0 га. Перакрываецца суглінак пяскамі да 1 м таўшчыні.	11	№ 43/II	н. р.
6	473	Суглінак морэнавы	в. Бялевічы	Чырвона-буры морэнавы суглінак сустракаецца на плошчы паміж вёскамі Бялевічы і Малашэвічы. Таўшчыня суглінку больш 2,0 м. Перакрывае яго лёсаваты суглінак 0,5—08, м таўшчынёю.	11	№ 56/II	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
7	474	Суглінак морэнавы	в. Танежыцы	Морэнавы чырвона-буры суглінак, пашыраны на плошчы колгасу Майскі Прамень да 4,0 га. Таўшчыня суглінку каля 4,0 м. Перакрыша 0,2—0,6 м.	11	№ 62/II	н. р.
8	475	Суглінак морэнавы	в. Старчыцы	Морэнавы чырвона-буры суглінак таўшчынёю больш 3,0 м залягае пад глебавым пластком на плошчы да 4,0 га ў ваколіцы вёскі Старчыцы.	11	№ 34/II	н. р.
				№ 96—43. Чэрвенскі раён.			
1	406	Вапняк палеозойскі	в. Раванічы	Вапнякі сылюрскага ўзросту знойдзены ля ўрочышча Бяздоніца—Вапельня ля вёскі Раванічы непасрэдна пад глебавым пластком на плошчы ня больш 0,25 га. Таўшчыня вапняку каля 0,8 м. У значнай ступені гэтыя адклады зьнішчаны ранейшымі распрацоўкамі. Паводле даных хэмічных аналізаў, зробленых Хэмічным Інстытутам БАН, вапнякі гэтыя зьяўляюцца долёмітызаванымі і маюць ад 30,86% да 37,27% CaO, ад 7,41% да 10,91% MgO пры нерастворнай астачы ад 5,09% да 19,53%.	18 19 22	—	—
2	407	Вапняк палеозойскі	в. Хутар	Вапнякі сылюрскага ўзросту знойдзены ва ўрочышчы Смалярня ля в. Хутар у адлегласьці 1,0—1,5 клм на NW ад вурочышча Бяздоніцы. Гэтыя адклады, знойдзеныя геолёгам Карнажыцкім А. Н., маюць той-жа самы характар, што і ў Раванічах, але яны крыху лепш захаваліся ад ранейшай распрацоўкі.	19 22	—	—

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
3	183	Гліна	в. Равачы	Гляўконітавая гліна зялёнага і цынамонавага колеру палеозойскага ўзросту залягае на глыбіні 0,6—1,5 м; мае таўшчыню да 2,65 м. Заўважана ва ўрочышчы Бяздоніца.	19 22	—	н. р.
4	408	Валун вапняковы	в. Маконя	Згуртаваньні вапняковых валуноў і галькі знаходзяцца ў полі ля сялібы грам. Сянетава і ў лесе ля самай дарогі на Пацічоў і Смалявічы. Дзякуючы ранейшым распрацоўкам, засталіся толькі часткі згуртаваньня.	22	—	Распрацоўваюцца
				№ 97—59. Чэрыкаўскі раён.			
1	78	Крэйда	в. Вохар	Крэйдавыя адклады выйшлі на паверхню на правым беразе ракі Сажа ля в. Вохар. Абгаленьне нязначных памераў.	6	№ 87	н. р.
2	79	Крэйда	саўгас Міхалін	Абгаленьне крэйды блізка роўню вады ў рацэ на правым беразе яе, побач з вёскаю Вохар.	6	№ 51	н. р.
3	94	Крэйда	в. Вусьце	Крэйда знаходзіцца ў абгаленьні правага берагу ракі Сажа, дзе яна ўздымаецца на 7,5 м вышэй узроўню вады ў рацэ. Абгаленьне мае дзьве паасобныя часткі крэйды, падзеленыя паміж сабою пяскамі і глінамі, якія запоўнілі скіданую западзіну ў крэйдзе. Цягнецца крэйда ўздоўж берагу да 120 м. Згодна з данымі хэмічных аналізаў, зробленых у лябораторыі тэхнічнай хэміі БДУ, крэйда з гэтага абгаленьня мае ад 52,20% да 54,46% CaO; нерастворная астача не заўважана больш, як 3,1%.	7	№ 141	н. р.

№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралу	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралу	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
4 96	Крэйда	в. Гронаў	Пад значнай тоўшчаю розных пяскоў ля самае вёскі абгаляецца крэйда. Значныя абсыпы вышэйляжачых пяскоў.	7	№ 152	н. р.
5 97	Крэйда	в. Мірагошч	Надпойменая тэраса правага берагу ракі Сажа ля вёскі Мірагошч уздымаецца, прыблізна на 6 м, вышэй роўню вады ў рацэ. Крэйда да 3,0 м назіранае таўшчыні. Зьверху перакрыта белымі кварцавымі пяскамі 1,5 м і яшчэ вышэй лёсаватым суглінкам 1,5 м. На тэрасе ў гэтым месцы пабудавана вёска.	6	№ 27	н. р.
6 98	Крэйда	в. Вепрынь	Крэйда выходзіць на паверхню непасрэдна ў самай вёсцы і яе ваколіцах, у бліжэйшым хваёвым бару, у адлегласьці 1 клм ад вёскі ва ўрочышчы Варацец і інш. мясцох. Адклады крэйды перакрываюцца рознымі пяскамі і суглінкамі ад 1 да некалькіх мэтраў агульнае таўшчыні.	7	№ 17	н. р.
7 99	Крэйда	в. Селішча	Значнае абгаленьне крэйды ў падмыве левага берагу рэчкі Сажа, даўжынёю да 160 м. У найвышэйшым пункце крэйда ўздымаецца на 5 м вышэй роўню вады ў рацэ. Адклады крэйды перакрыты тут сьветлымі пяскамі.	7	№ 23—29	н. р.
8 100	Крэйда	в. Горкі	Абгаленьне крэйды на правым беразе ракі Сажа, перакрытае іншымі адкладамі да 6 м таўшчыні. Крэйда ўздымаецца на 3,0 м вышэй роўню вады ў рацэ.	6	№ 48	н. р.
9 101	Крэйда	в. Журавель	Нязначныя абгаленьні крэйды на правым беразе ракі Сажа непасрэдна ля вёскі ня вы-	6	№ 49	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
				шэй 2 м над роўнем вады ў рацэ. Адзначаецца няглыбокае знаходжаньне, побач з верхняй няроўнай паверхняй, крэйдавых адкладаў.			
10	102	Крэйда	в. Журавель	Абгаленьне крэйды па правым беразе ракі Сажа, прыблізна, 2 клм ніжэй па цячэньні ракі ад в. Журавель.	6	№ 53	н. р.
11	123	Фасфарыты	в. Вусьце	Вызначаюцца тры прапласткі фасфарытавых конкрэцый сярод зеленавата-шэрых пяскоў, уключаных у западзіне скідомага тыпу паміж двума выступамі крэйды. Колькасьць у абгаленьні нязначная. Фасфарытавыя конкрэцыі пескаватага тыпу, паводле даных лябораторыі тэхнічнае хэміі БДУ, маюць ад 11,56% да 15,47% P_2O_5 (хэм. ан. № 2, 8 і 10).	6	Абг. № 42	н. р.
12	124	Фасфарыты	г. Чэрыкаў	Пры дасьледваньні ў ваколіцах Чэрыкава мною ў адным з равоў на значным схіле правага берагу ракі Сажа было выяўлена, што з-пад чырвона-бурага морэнавага суглінку выйшлі зялёна-шэрыя пяскі, маючыя прапластак галечніку з пескаватымі фасфарытавымі конкрэцыямі. Колькасьць фасфарытаў і іх пашырэньне не высьвятляліся, бо галоўнейшая ўвага была зьвернута на вызначэньне стратыграфічнага стану гэтых адкладаў.	7	№ 40	н. р.
13	168	Крэмень	в. Горкі	У рэчнай гальцы і пяскох правага берагу ракі Сажа ля в. Горкі часьцей пракідаюцца сьцяжэньні крэменю крэйдавага пэрыоду.	7	—	н. р.

№№ па парадку	№ па рэгістрацыйнаму сьпісу	Назва пароды альбо мінэралю	Месцазнаходжаньне адкладу альбо згуртаваньня	Характарыстыка карыснага выкапню і ўмовы яго знаходжаньня	№ працы аўтара па сьпісу А	№ узору пароды альбо мінэралю	Даныя аб распрацоўцы карыснага выкапню
14	153	Пясок	в. Гронава	Значнае абгаленьне сьвіты пяскоў выяўляецца на левым беразе ракі Сажа ля в. Гронава. Пяскі чацьвярцёвага ўзросту і рознага характару.	6	№ 281	н. р.
15	131	Гліна	в. Мірагошч	Вышэй крэйды знойдзены адклады шэрай, маючай гляўконіт тыпу флёрыдынавых, гліны таўшчынёю да 0,2 м, перакрытай пяскамі 0,5—1.0 м таўшчыні.	7	—	н. р.
16	108	Буры жалязьняк	в. Вохар	Буры жалязьняк алягае паасобнымі згуртаваньнямі на правым беразе ракі Сажа на лугу супроць канца сялібных вучасткаў в. Вохар.	6	№ 51	н. р.
				№ 98—84. Шклоўскі раён.			
1	202	Пясок	в. Бальшая Зарэчча	Непасрэдна здабываўся з рэчышча ракі Дняпро ніжэй утоку невялічкай рэчкі Чарнічкі, ва ўрочышчы Лапатыя дробна-зярнёвы аднародны лушчаковы кварцавы пясок сьветла-белага колеру ля в. Вялікае Зарэчча.	6	A_1	Раней распрацоўваўся для вырабу кахлі ў колькасьці 50.000 пудоў штогод
				№ 99—95. Юравіцкі раён.			
1	490	Буры жалязьняк	в. Бярозаўка	Буры жалязьняк сустракаецца на правым беразе рэчкі Тур'і і ўздоўж пракапанае канавы на глыбіні 0,5 м працяжнасьцю да 1,0 м. Таўшчыню буры жалязьняк мае 0,07 м. Пракідаецца паасобнымі згуртаваньнямі.	42	—	н. р.

РЭГІСТРАЦЫЙНЫ СЬПІС КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ БССР

(па карысных выкапнях)

1. Долёміты і долёмітызаваныя вапнякі пластовыя.

233—2*);229—2; 231—2; 232—2; 230—2; 4—3; 421—3; 422—3; 337—18; 338—18; 47—18; 48—18; 339—18; 49—18; 306—28; 305—28; 223—67; 224—67; 225—67; 3—76; 63—88; 406—96; 407—96.

2. Вапнякі пластовыя палеозойскага ўзросту.

340—18; 62—48; 61—48.

3. Крэйда пішучая, гліністая і г. д.

423—5; 424—5; 1—5; 425—5; 426—5; 2—5; 427—5; 410—12; 279—26; 506—27; 411—31; 194—38; 195—38; 196—38; 197—38; 198—38; 412—38; 104—40; 105—40; 103—40; 93—40; 92—40; 91—40; 82—40; 83—40; 84—40; 85—40; 86—40; 87—40; 88—40; 89—40; 90—40; 95—40; 420—40; 172—42; 170—42; 400—42; 401—42; 171—42; 417—45; 70—48; 71—48; 81—48; 80—48; 72—48; 73—48; 74—48; 75—48; 76—48; 77—48; 169—49; 402—49; 403—49; 445—54; 446—54; 65—60; 66—60; 67—60; 69—60; 68—60; 201—67; 189—67; 190—67; 191—67; 192—67; 193—67; 447—69; 448—69; 280—74; 281—74; 282—77; 199—90; 200—90; 476—92; 468—95;469—95: 78—97; 79—97; 94—97; 96—97; 97—97; 98—97; 99—97; 100—97; 101—97; 102—97.

4. Маргелі дрэўнія рознага геолёгічнага ўзросту.

251—2; 252—2; 253—2; 166—39; 164—39; 105—39; 413—39; 162—39; 163—39; 157—40; 212—67; 213—67; 158—88; 159—88; 160—88; 161—88.

5. Маргелі лугавыя і вазёрныя чацьвярцёвага часу.

293—4; 37—15; 397—15; 304—20; 436—30; 249—43; 250—43; 248—43; 247—43; 244—43; 245—43; 246—43; 186—49; 492—62; 493—62; 491—62; 329—70; 330—70; 331—70; 227—77; 490—81; 391—81; 392—81; 521—91; 522—91; 393—94.

6. Травэрцыны. 516—60.

---

*) Першая лічба — рэгістрацыйны № карыснага выкапню па карце; другая — № раёну па алфабэту.

7. Лёсы. 514—60; 515—60; 513—60; 114—60.

8. Суглінкі розныя.

234—2; 22—3; 23—3; 24—3; 434—5; 14—5; 435—5; 18—5; 59—8; 53—8; 332—8; 399—15; 350—18; 351—18; 52—18; 276—19; 275—19; 268—20; 359—21; 283—26; 28—30; 32—30; 29—30; 15—30; 181—33; 136—40; 442—41; 443—41; 444—41; 236—43; 237—43; 509—44; 510—44; 418—48; 419—48; 367—56; 368—56; 54—56; 511—60; 512—60; 499—62; 496—62; 498—62; 497—62; 277—66; 21—69; 482—69; 483—69; 480—69; 481—69; 479—69; 525—69; 328—70; 373—73; 450—74; 451—74; 452—74; 453—74; 182—75; 462—77; 463—77; 464—77; 466—79; 25—79; 26—79; 467—79; 385—81; 386—81; 58—81; 518—82; 55—94; 472—95; 473—95; 474—95; 475—95.

9. Гліны. 238—2; 12—3; 432—5; 433—5; 27—5; 20—11; 19—11; 298—17; 299—17; 300—17; 301—17; 352—18; 353—18; 51—18; 302—19; 56—21; 307—28; 242—29; 241—29; 239—29; 240—29; 30—30; 31—30; 16—30; 208—38; 209—38; 143—39; 142—39; 138—39; 139—39; 140—39; 141—39; 134—40; 441—41; 235—43; 133—48; 137—48; 135—48; 288—52; 243—55; 180—59; 179—59; 495—62; 17—63; 313—66; 314—66; 316—66; 315—66; 278—66; 317—66; 318—66; 319—66; 320—66; 321—66; 322—66; 323—66; 324—66; 210—67; 211—67; 207—67; 13—69; 523—69; 524—69; 327—70; 291—72; 290—72; 287—72; 380—78; 57—78; 178—85; 487—87; 292—87; 206—90; 305—94; 183—96; 131—97.

10. Пяскі. 428—5; 429—5; 430—5; 431—5; 504—6; 505—6; 349—18 60—18; 354—21; 355—21; 356—21; 366—22; 11—30; 148—39; 149—39; 150—39; 151—39; 152—39; 154—39; 145—40; 254—43; 507—44; 508—44; 155—48; 156—48; 144—48; 310—51; 289—52; 513—60; 270—66; 269—66; 205—67; 204—67; 449—69; 374—73; 454—74; 459—77; 460—77; 461—77; 376—78; 387—81; 388—81; 389—81; 259—82; 260—82; 146—88; 147—88; 203—90; 470—95; 471—95; 153—97; 202—98.

11. Граві. 333—8; 334—8; 335—8; 348—18; 364—22; 365—22; 372—73.

12. Галечнікі. 502—6; 509—6; 344—18; 345—18; 346—18; 347—18; 357—21; 358—21; 363—22; 369—61; 375—73; 456—77; 457—77; 458—77; 383—81; 384—81.

13. Валуны крышталёвых парод.

294—4; 500—6; 501—6; 336—8; 295—17; 296—17; 297—17; 341—18; 342—18; 343—18; 360—22; 361—22; 309—51; 311—66; 312—66; 484—69; 379—73; 371—73; 377—78; 378—78; 379—78; 33—79; 34—79; 381—81; 382—81; 517—82.

14. Валуны вапняковыя.

258—2; 264—2; 263—2; 262—2; 44—7; 41—13; 38—13; 40—13; 396—13; 39—13; 398—15; 272—17; 273—20; 274—20; 362—222; 5—23; 267—29; 266—29; 265—29; 173—42; 175—49; 43—49; 50—56; 64—60; 42—65; 46—65; 45—65; 174—68

177—75; 176—75; 185—75; 404—75; 405—75; 285—76; 519—91; 520—91; 408—96.

15. Флёрыдзіны. 130—60; 132—60.

16. Фасфарыты. 477—5; 478—5; 129—39; 122—40; 125—40; 28—40; 127—40; 121—48; 116—60; 117—60; 118—60; 115—60; 119—60; 120—60; 226—67; 123—97; 124—97.

17. Іскракі. 526—40; 527—12.

18. Крэмені. 255—2; 215—38; 216—38; 167—48; 214—67; 168—97.

19. Трэпелы. 255—43; 256—43.

20. Апокі. 414—40; 415—40; 416—40.

21. Жалезьнякі бурыя.

36—7; 5—15; 303—19; 7—23; 10—23; 9—30; 437—30; 438—30; 439—30; 440—30; 488—32; 284—36; 221—38; 22—38; 112—39; 109—40; 110—40; 106—48; 107—48; 184—49; 489—58; 286—58; 494—62; 217—67; 218—67; 219—67; 220—67; 8—69; 325—70; 326—70; 455—74; 465—77; 486—87; 111—88; 108—97; 490—99.

22. Гэматыты. 6—79; 261—82.

23. Торфа-вугалі і сапрапэлі.

308—28; 188—49; 228—64.

24- Крыніцы мінэралізаваныя

485—5; 271—20; 187—49; 409—59; 394—94.

ЗЬМЕСТ.

Стар.

1. Уступ 3
2. Агульная характарыстыка карысных выкапняў, зьмешчаных у рэгістрацыйным сьпісе 7
3. Табліца агульнага падліку і разьмеркаваньня паасобных карысных выкапняў БССР па раёнах 21
4. Рэгістрацыйны сьпіс карысных выкапняў БССР (па раёнах) . 31
5. Рэгістрацыйны сьпіс карысных выкапняў БССР (па карысных выкапнях) 131
6. Сьпіс паасобных монографій, справаздач і іншых матар'ялаў па геолёгіі, з якіх узяты некаторыя даныя для складаньня сьпісу карысных выкапняў БССР 135
7. Карта карысных выканьняў БССР 141

Арх2
3675

Арх2
3678